

Evaluation of foliar application of cytokinin, iron, zinc and selenium on chlorophyll fluorescence parameters of wheat (*Triticum aestivum* L.) under drought stress

A. Faridnia¹, F. Paknejad^{1*}, M. Sadeghi Shoa², M. N. Ilkaee¹, F. AghaYari¹

1- Department of Agronomy and Plant Breeding, Ka.C. Islamic Azad University, Karaj, Iran

2- Department of Agronomy and Plant Breeding, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

Corresponding Author Email: Farzadpaknejad@iau.ac.ir

Introduction

Environmental stresses are important factors in reducing agricultural production worldwide. Plants are continuously exposed to various stresses under natural and agricultural conditions, and water scarcity is the most important limiting factor for crop yield in most parts of the world. Drought stress can cause morphological, physiological, and biochemical changes in crop plants. Cytokinin application and foliar application of micronutrients can have beneficial effects on plant photosynthesis and wheat yield under moisture stress conditions.

Materials and Methods

This study was conducted as a split plot factorial as a randomized complete block design with three replications in two regions of Karaj and Hamadan during 2019-2020 crop years. Experimental treatments were irrigation regimes with three levels (irrigation at 40% available moisture discharge throughout the growing season (control), normal irrigation from planting date to pollination stage and thereafter irrigation at 60% available moisture discharge, normal irrigation from planting date to pollination stage then stage then cut off with holding irrigation till maturity), as the main plots. Factorial factor of low-consumption nano-elements with five levels: control (no nano-micronutrients), zinc, iron, selenium and a combination of three elements), and cytokinin application timing with four levels (control, flowering stage, milking and flowering stage + milking) were evaluated as a sub-factor. Traits such as grain yield, biological yield and fluorescence parameters were measured.

Results and Discussion

The results indicate that the effects of irrigation, cytokinin and Nano-micronutrient treatments on the studied traits were significant, but the interaction effects of these treatments were not significant. Drought stress has an inhibitory effect on various photosynthetic activities, especially photosystem II activity, in wheat. In the present study, it was determined that chlorophyll fluorescence parameters along with chlorophyll content have a special role in investigating the effects of drought stress on plant photosynthetic systems. Therefore, by applying drought stress, the rate of transpiration, gas exchange, maximum photochemical efficiency of photosystem II, maximum fluorescence

(F_m) and photosynthesis rate decreased. However, the use of cytokinin hormone and the combined application of micronutrients significantly increased the rate of photosynthesis, stomatal conductance, transpiration intensity, maximum photochemical efficiency of photosystem II, maximum fluorescence (F_m), minimum fluorescence (F_0), relative water content of leaf and chlorophyll content. Normal irrigation treatment increased the stable fluorescence (26.68%) and the variable fluorescence index (24.78%) compared to the normal irrigation treatment until pollination and then completely stopped irrigation. Zinc + iron + selenium elements improved the stable fluorescence (26.16%) and variable fluorescence (21.48%) compared to the control treatment. Foliar application of cytokinin at pollination + grain milking increased the stable fluorescence (15.34%) and variable fluorescence (20.74%) compared to the control. Drought stress had an inhibitory effect on various activities of the photosynthetic apparatus, especially the activity of photosystem II, in wheat, but the application of micronutrients and the hormone cytokinin reduced the inhibitory effect. The improvement of photosynthesis by cytokinin and micronutrients under stress may be due to the effect of these substances in maintaining leaf chlorophyll. It seems that cytokinin and micronutrients have inhibitory effects on the functioning of the photosynthetic apparatus. According to the results obtained, it can be concluded that the decrease in the quantum yield of photosystem II is mainly due to the occurrence of disorder in the chloroplast and the decrease in chlorophyll also confirms this issue, because chlorophyll fluorescence is directly related to the activity of chlorophyll in the reaction of photosystems and can be used as a criterion for measuring the efficiency of the photosystem.

Conclusion

The combined application of nano micronutrients (zinc + iron + selenium) led to an increase in wheat yield compared to the application of each of them individually, so the combined foliar application of these three elements is recommended to increase wheat yield. Cytokinin foliar application at the pollination + grain milk stage increased wheat yield compared to application at other stages, although various sources consider the application of nano micronutrients and cytokinin foliar application important for water stress tolerance, but the results of the present study showed that in conditions of low irrigation and stress, these strategies are not recommended to reduce the negative effects of deficit irrigation.

Keywords: Chlorophyll index, Leaf relative humidity, Micronutrients, Steady fluorescence, Variable fluorescence

ارزیابی محلول پاشی سیتوکینین، آهن، روی و سلنیوم بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل گندم (*Triticum aestivum* L.)

تحت تنش خشکی

امیر فریدنیا^۱، فرزاد پاک‌نژاد^۱، مهدی صادقی شعاع^۲، محمد نبی ایلکایی^۱، فیاض آقایی^۱

۱- گروه زراعت و اصلاح گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

۲- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

ایمیل نویسنده مسئول: Farzadpaknejad@iau.ac.ir

چکیده

به منظور ارزیابی سیتوکینین و محلول پاشی عناصر ریزمغذی و اثرات مفیدی آنان بر فتوسنتز گیاه و عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی، پژوهشی در دو منطقه کرج و همدان به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل رژیم‌های آبیاری با سه سطح (الف: آبیاری در ۴۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس در تمام دوره رشدی (شاهد)، ب: آبیاری نرمال تا گرده افشانی و ج: آبیاری در ۶۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس تا پایان دوره رشد، آبیاری نرمال تا گرده افشانی و قطع آبیاری تا پایان دوره رشد)، در کرت‌های اصلی و فاکتوریل عناصر نانو کم مصرف با پنج سطح: شاهد (عدم مصرف عناصر ریزمغذی نانو)، محلول پاشی روی، آهن، سلنیوم و ترکیب سه عنصر (آهن+روی+سلنیوم) و زمان استفاده از سیتوکینین با چهار سطح (شاهد (عدم مصرف)، مصرف در مرحله گل دهی، مصرف در مرحله شیری شدن و مصرف در مرحله گلدهی+شیری شدن) در کرت‌های فرعی بودند. نتایج نشان داد که تیمار آبیاری نرمال، موجب افزایش فلورسانس پایدار (۲۶/۶۸ درصد)، شاخص فلورسانس متغیر (۲۴/۷۸ درصد) نسبت به تیمار آبیاری نرمال تا گرده افشانی و بعد از آن قطع کامل آبیاری شد. عناصر روی+آهن+سلنیوم، سبب بهبود فلورسانس پایدار (۲۶/۱۶ درصد) و فلورسانس متغیر (۲۱/۴۸ درصد) نسبت به تیمار شاهد شد. محلول پاشی سیتوکینین در گرده افشانی+شیری شدن دانه، فلورسانس پایدار (۱۵/۳۴ درصد) و فلورسانس متغیر (۲۰/۷۴ درصد) نسبت به شاهد افزایش داد. بنابراین اعمال تنش خشکی بر گندم قابل توصیه نیست و کاربرد هورمون سیتوکینین و همچنین عناصر ریزمغذی برای بهبود شرایط کشت گندم قابل توصیه است.

کلمات کلیدی: شاخص کلروفیل، رطوبت نسبی برگ، عناصر ریزمغذی، فلورسانس پایدار، فلورسانس متغیر

گندم (*Triticum aestivum* L.) از مهم‌ترین غلات در کل دنیا و پر ارزش‌ترین گیاهان روی زمین است که بیش از هر محصول دیگری در دنیا کشت می‌شود. این گیاه راهبردی حاوی پروتئین و کالری بیشتری نسبت به سایر غلات است که بیش از هر محصول دیگری تأمین کالری نموده و بیشترین پروتئین را در رژیم غذایی انسان عرضه می‌کند (Kamel et al., 2014; Seleiman et al., 2018). گندم از نظر تولید و سطح زیر کشت سالانه در ایران و جهان در درجه اول اهمیت قرار دارد. سطح زیر کشت گندم دیم در ایران بیش از ۴ میلیون هکتار است که بیشترین سطح زیر کشت زمین‌های زراعی را شامل می‌شود. بنابراین استقلال غذایی و خود کفایی در تأمین مواد غذایی کشور مستلزم توجه زیاد به زراعت در اراضی دیم است (Agricultural Statistics, 2022). افزایش تقاضا برای غذا و مواد مغذی به دلیل رشد جمعیت، اهمیت محصول گندم را بیش از پیش افزایش می‌دهد (Hussain & Jatoi, 2021).

تنش‌های محیطی از عوامل حائز اهمیت در کاهش تولید محصولات کشاورزی در سراسر دنیا هستند. گیاهان تحت شرایط طبیعی و زراعی به‌طور پیوسته در معرض تنش‌های گوناگون قرار می‌گیرند و در این میان کمبود آب مهم‌ترین عامل محدودکننده عملکرد محصولات زراعی در بیشتر نقاط جهان می‌باشد. تنش خشکی می‌تواند باعث تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاهان زراعی شود. در شرایط خشکی ترکیبات شیمیایی گیاهان از جمله قند، پروتئین و میزان کلروفیل می‌توانند در راستای افزایش مقاومت به تنش خشکی تغییر کنند. علاوه بر این، تنش خشکی نه تنها راندمان تولید را کاهش می‌دهد، بلکه فرسایش خاک و همچنین تخریب محیط زیست را نیز به همراه دارد (Guerrini et al., 2020; Bhandari et al., 2020). فتوسنتز مهم‌ترین فرآیند شیمیایی روی زمین است. همچنین یک فرآیند فیزیولوژیکی کلیدی در رشد و نمو محصولات کشاورزی است و به شدت تحت تأثیر تنش خشکی قرار دارد (Han et al., 2023). کلروفیل به عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین رنگدانه در فتوسنتز می‌تواند منعکس کننده وضعیت رشد گیاهان و میزان تنش باشد. برای ارزیابی اثر تنش خشکی بر فتوسنتز گیاه از پارامترهای فلورسانس کلروفیل استفاده می‌شود. درواقع ارزیابی فلورسانس کلروفیل تخمینی از نحوه عملکرد فتوسنتز است. فلورسانس کلروفیل مؤلفه‌های مختلفی دارد که با ارزیابی آن‌ها می‌توان فعالیت فتوسیستم I و II را مورد بررسی قرار داد. با افزایش فلورسانس کلروفیل در شرایط تنش خشکی، کارایی فتوسنتز کاهش می‌یابد. بنابراین ارزیابی فلورسانس کلروفیل می‌تواند برای تعیین وضعیت فیزیولوژی گیاه و آسیب به سازوکار فتوسنتزی استفاده شود (Wasaya et al., 2021; Yan et al., 2021). فتوسنتز یکی از اصلی‌ترین فرایندهای متابولیکی است که بر بازده غلات تأثیر می‌گذارد. بنابراین فعالیت فتوسنتز خالص و محتوای کلروفیل شاخص‌های مهم سازگاری گندم با تنش گرما و سایر عوامل تنش‌زای غیر زنده هستند (Bhandari et al., 2021). لذا ارائه راهکارهایی جهت مقابله با اثرات منفی ناشی از تنش خشکی با حفظ و یا کاهش کمتر عملکرد محصول امری بسیار ضروری است.

یکی از راهکارهای مقابله با تنش خشکی کاربرد عناصر ریزمغذی است. محققان اظهار داشتند که استفاده از کودهای ریزمغذی می‌تواند نتایج قابل توجهی در رابطه ویژگی‌های عملکرد و افزایش دسترسی به مواد مغذی و تأثیر بر پارامترهای فیزیولوژیکی محصول داشته باشد. همچنین کاربرد

عناصر ریزمغذی باعث افزایش عملکرد محصول و بهبود اثربخشی استفاده از عناصر پرمصرف در گیاه می‌شود (Saquee et al., 2023). برخی عناصر غذایی کم‌مصرف همانند روی و آهن، برای رشد گیاه ضروری هستند و در فرآیندهای فیزیولوژیکی، مانند فتوسنتز، تولید هورمون‌های رشد و تشکیل کلروفیل دخالت دارند و کمبود آن‌ها می‌تواند موجب عدم توازن عناصر غذایی در گیاه و در نهایت کاهش کمی و کیفیت محصول شود (Hayyawi et al., 2020; Mohammed Al-Toki & Halloul, 2021). پژوهشگران اظهار داشتند که کاربرد روی موجب افزایش عملکرد و کارایی فتوسنتز گندم نسبت به شاهد شد و اثرات منفی ناشی از تنش خشکی را کاهش داد (Anwar et al., 2021). سلنیوم یکی دیگر از ریزمغذی‌ها است که به دلیل حضور در سیستم‌های دفاعی آنتی‌اکسیدانی و تعادل هورمونی به عنوان یک عنصر مهم برای گیاه شناخته شده است (Titov et al., 2022). همچنین سازوکارهای محافظتی سلنیوم در گیاهان در برابر تنش‌ها از طریق تنظیم فعالیت آنزیمی گیاهان و افزایش ترکیبات آنتی‌اکسیدانی آنتوسیانین‌ها، فلاونوئیدها، ترکیبات فنلی است. این سیستم‌های آنتی‌اکسیدانی خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، سلنیوم می‌تواند فتوسنتز گیاهان را با افزایش کارایی فتوسیستم، افزایش فلورسانس کلروفیل و کاهش تخریب غلظت کلروفیل بهبود بخشد. سلنیوم به تنظیم وضعیت آب در گیاهان با ارتقای راندمان جذب آب از ریشه و کاهش از دست دادن آب از بافت‌ها کمک می‌کند و باعث تحریک رشد گیاه با ارتقای یکپارچگی سیستم غشایی می‌شود که منجر به ازدیاد طول ریشه و ساقه و تجمع زیست توده می‌شود (Li et al., 2022; Raza et al., 2020). محققان گزارش کردند که کاربرد سیتوکینین باعث بهبود رشد گیاه، کاهش اثرات سوء گونه‌های فعال اکسیژن و افزایش انتقال مواد جذب شده به دانه‌ها در شرایط تنش خشکی می‌شود (Raza et al., 2020). علاوه بر این گزارش شد که کاربرد ۱۰۰ میکرومولار سیتوکینین موجب افزایش به ترتیب ۴/۳۶ درصد، ۷/۲۱ درصد، و ۵/۵۵ درصد عملکرد دانه گندم در زمان اعمال خشکی در مراحل پنجه‌زنی، گرده‌افشانی و پر شدن دانه شد. سیتوکینین موجب افزایش سایر پارامترهای فیزیولوژیکی شامل سرعت فتوسنتز، شاخص سطح برگ و محتوای کلروفیل شد. سیتوکینین رشد گیاه را بهبود بخشید، اثرات نامطلوب گونه‌های فعال اکسیژن را به حداقل رساند و انتقال مواد فتوسنتزی به دانه‌ها را در شرایط خشکسالی افزایش داد (Raza et al., 2020). با توجه به کاربرد سیتوکینین و ریزمغذی‌ها بر کاهش اثرات حاصل از تنش خشکی، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توأم محلول‌پاشی هورمون سیتوکینین و ریزمغذی‌ها در شرایط تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل و عملکرد گندم در شرایط آب و هوایی دو منطقه کرج و همدان اجرا شد.

مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر به صورت اسپلینت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه کرج و همدان در سال زراعی ۱۳۹۸-۹۹ بر روی گندم (*Triticum aestivum* L.) اجرا شد. تاریخ کاشت در منطقه کرج ۱۷ مهرماه و در همدان ۱۴ مهرماه بود. اطلاعات هواشناسی مربوط به سال زراعی از ایستگاه سینوپتیک هر دو منطقه در جدول ۱ ارائه شده است. تیمارهای آزمایش شامل رژیم آبیاری با سه سطح

(آبیاری در ۴۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس در تمام دوره رشدی (شاهد)، آبیاری نرمال تا گرده‌افشانی (معادل کد ۶۹ براساس مقیاس BBCH) و آبیاری در ۶۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس تا پایان دوره رشد، آبیاری نرمال تا گرده‌افشانی و قطع آبیاری تا پایان دوره رشد)، که در کرت‌های اصلی قرار گرفت و عامل دوم عناصر نانو کم‌مصرف با پنج سطح شامل روی، آهن، سلنیوم، ترکیب سه عنصر و شاهد (عدم مصرف عناصر ریزمغذی نانو) و زمان استفاده از سیتوکینین با چهار سطح شامل مصرف در مرحله گل‌دهی، مصرف در مرحله شیری‌شدن و مصرف در مرحله گلدهی+شیری‌شدن و شاهد (عدم مصرف)، که به صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی قرار گرفت.

جدول ۱- اطلاعات هواشناسی در دو منطقه همدان و کرج

Table 1- Meteorological information in Hamadan and Karaj regions

Table 1- Meteorological information in Hamadan and Karaj regions									
ماه‌های کشت Cultivation months		رطوبت (درصد)		بارندگی (میلی‌متر)		حداکثر دما (درجه سانتی‌گراد)		حداقل دما (درجه سانتی‌گراد)	
		Humidity (%)		Precipitation (mm)		Maximum temperature (°C)		Minimum temperature (°C)	
		همدان Hamadan	کرج Karaj	همدان Hamadan	کرج Karaj	همدان Hamadan	کرج Karaj	همدان Hamadan	کرج Karaj
مهر	October	40	43	162.2	130.5	18	25	5	7
آبان	November	39	44	151.5	128.5	14	20	1	2
آذر	December	42	45	141.5	83	13	18	-2	-1
دی	January	43	42	143.5	97.5	10	14	-4	-3.2
بهمن	February	44	41	117.5	145.2	11	12	-7.5	-3.5
اسفند	March	41	54	124.5	105.5	14	13.3	-1	1
فروردین	April	38	48	121.2	97	16	15.5	3	5
اردیبهشت	May	42	42	112.6	104.5	16.5	19	9	11
خرداد	June	43	46	0	0	23.5	29.3	14	18

جدول ۲- برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

Table 2- Some physical and chemical properties of soil

منطقه Region	هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر) Electrical conductivity (dS.m ⁻¹)	pH	نیترات (میلی‌گرم بر کیلوگرم) No ₃ (mg.kg ⁻¹)	پتاسیم (میلی‌گرم بر کیلوگرم) potasium (mg.kg ⁻¹)	مواد آلی (درصد) Organic matter (%)	فسفر (میلی‌گرم بر کیلوگرم) (mg.kg ⁻¹)	سدیم (میلی‌اکی‌والان بر لیتر) Sodium (meq.l ⁻¹)	بافت خاک Soil Texture
همدان Hamadan	1.14	7.67	7.44	509.12	0.81	13.12	6.83	لومی رسی Clay loam
کرج Karaj	2.26	8.07	8.11	411.27	0.19	8.32	7.11	رسی Clay

عملیات اجرایی در مهرماه سال ۱۳۹۸ با کشت بذر در مناطق کرج و همدان، با تراکم ۴۰۰ بذر در مترمربع، آغاز گردید. عملیات آماده‌سازی زمین در هر منطقه، شامل شخم عمیق، دیسک و تسطیح لازم در پائیز بود. قبل از آماده‌سازی نهائی زمین، نمونه‌برداری مرکب خاک از عمق ۳۰- سانتی‌متری انجام و نسبت به تعیین میزان عناصرغذائی موجود در آن اقدام گردید (جدول ۲). زمان آبیاری به‌وسیله بلوک گچی براساس تخلیه رطوبتی زمین مشخص و اجرا شد. بلوک‌ها قبلاً در مزارع تحت کشت مورد آزمایش واسنجی قرار گرفته بودند. برای محاسبه میزان آب آبیاری در هر نوبت، از روش اندازه‌گیری محتوای رطوبت خاک استفاده شد. بدین منظور قبل از هر آبیاری، رطوبت خاک به وسیله دستگاه تی.دی.آر اندازه‌گیری شد و حجم آب مورد نیاز در تیمار آبیاری کامل، براساس اختلاف بین رطوبت خاک و حد ظرفیت زراعی برآورد گردید. با توجه به مساحت هر کرت، حجم آب آبیاری در هر نوبت براساس منحنی تخلیه رطوبتی قابل دسترس که از قبل به‌دست آمده بود، محاسبه شد (Paknejad et al., 2007). هورمون سیتوکنین با غلظت ۷۰ میکرومولار از شرکت سازنده Alpha Chemika تهیه شد. نانو کود روی با غلظت ۲/۵ در هزار و نانو کود آهن با غلظت ۲ در هزار و سلینیوم به میزان ۲۰ گرم در هکتار در دو مرحله ساقه‌دهی و سنبله مورد استفاده قرار گرفتند. در حالت ترکیب کودها نیز همان مراحل اعمال شد. شرکت کود نانو روی ۱۲ درصد خضرا شماره ثبت کودی ۲۹۹۳۶ و شرکت کود نانو آهن ۹ درصد خضرا شماره ثبت کودی ۳۴۴۲۸ بود. محلول استوک نانو سلینیوم ۱۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر از شرکت Nanosany خراسان رضوی تهیه گردید.

قبل از کشت، کود نیتروژن از منبع اوره محاسبه و با توجه به خاک مزرعه و براساس توصیه‌های متخصص تغذیه بر مبنای آزمون خاک در هر دو منطقه به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار استفاده شد و به مقدار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل قبل از کاشت در مرحله آماده سازی زمین، به صورت یکنواخت در مزرعه پخش شد و با دیسک به عمق حدود ۱۵ سانتی‌متری خاک مخلوط شد. رقم بذر گندم استفاده شده SHS ۰۲۲ بود و از مرکز تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کرج تهیه شد. این رقم از دورگ‌گیری بین گندم میراکل و ارقام روسی ایجاد شده است. لاین حاصل توسط اشعه گاما موتاسیون شده و سلکسیون صورت گرفت. ساقه‌ها نسبت به ارقام معمولی پرت‌تر بوده و دارای یک سنبله اصلی و ۵-۱۰ سنبله فرعی منشعب از سنبله اصلی بوده و رنگ دانه آن قرمز می‌باشد. این رقم دارای تیپ رشد پاییزه بوده و مناسب مناطق سردسیر است. همچنین این رقم مقاوم به زنگ زرد، اما به خوابیدگی حساس است. روش کشت به صورت جوی و پشته‌ای توسط دستگاه کارنده غلات و با فاصله ۱۵ سانتی‌متر انجام شد، به‌طوری که فاصله هر پشته ۶۰ سانتی‌متر برای آبیاری بود که هر پشته شامل ۴ خط کشت ۱۵ سانتی‌متری و هر کرت شامل سه پشته و در مجموع ۱۲ خط کشت به طول ۶ متر بود. به‌طوری که بین کرت‌های فرعی ۶۰ سانتی‌متر و بین کرت‌های اصلی ۱۸۰ سانتی‌متر فاصله بود. تاریخ برداشت در کرج ۱۹ تیرماه و در همدان ۲۵ تیرماه بود. صفاتی نظیر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص کلروفیل، محتوای رطوبت نسبی برگ و پارامترهای فلورسانس اندازه‌گیری شدند. جهت نمونه‌برداری عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه، خط شماره ۱ و خط شماره ۱۲ و همچنین نیم‌متر از بالا و نیم‌متر از پایین کرت به عنوان حاشیه حذف و عملیات نمونه‌برداری از خطوط ۲ و ۴ انجام شد. در زمان ۲۰ روز بعد از گلدهی شاخص کلروفیل (عدد اسپد) با استفاده از دستگاه کلروفیل‌متر (SPAD) اندازه‌گیری شد. دستگاه

کالیبره شد و سپس کار قرائت را از سه نقطه از هر برگ انجام و بعد میانگین سه نقطه در نظر گرفته شد (Minolta, 1989). میزان محتوای رطوبت نسبی ۲۰ روز بعد از گل‌دهی (معادل کد ۶۵ براساس مقیاس BBCH)، از طریق معادله (۱) محاسبه شد (Ferrat & Loyal, 1999).

$$\text{معادله ۱: } RWC = \frac{FW-DW}{SW-DW} \times 100$$

که در رابطه فوق FW = وزن تر برگ، DW = وزن خشک برگ، SW = وزن اشباع برگ است. پارامترهای فلورسانس در مزرعه شامل فلورسانس اولیه (F_0)، حداکثر فلورسانس در تاریکی (F_m)، پتانسیل عملکرد کوانتوم (F_v/F_m)، حداکثر فلورسانس در روشنایی (F_m')، افت فتوشیمیایی فلورسانس (QP) و افت غیر فتوشیمیایی فلورسانس (Q_n) به وسیله (PAM 2000, Waltz, Germany) Portable Fluorescence Analyzer اندازه‌گیری شدند (جدول ۳). اندازه‌گیری‌ها ۲۰ روز بعد از گل‌دهی (معادل کد ۶۵ براساس مقیاس BBCH) از ساعت ۷ تا ۱۰ صبح انجام شد. برای اندازه‌گیری ابتدا گیره‌ها بر روی پهنک برگ قرار داده و منفذ میانی گیره‌ها بسته شدند تا عمل سازگاری با تاریکی به مدت نیم ساعت و با تابیدن نور قرمز (۶۹۵ نانومتر)، انجام شد. دستگاه به کار برده شده، نور با طول موج ۷۱۰ نانومتر را بازتاب می‌کند. پس از تاریک‌سازی، ابتدا گیره‌ها را به دستگاه فلورومتر وصل و سپس منفذ میانی گیره به منظور ورود نور به محفظه تاریک باز شد. بلافاصله دکمه روی دستگاه فلورومتر فشار داده شد تا شاخص‌های فلورسانس کلروفیل اندازه‌گیری و ثبت شود (Baker & Rosenquist, 2004). این دستگاه توانایی تخمین میزان آسیب‌های وارده در اثر تنش خشکی وارده به فتوسیستم II را دارا می‌باشد به طوری که با این ابزار کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II اندازه‌گیری می‌شود (Li et al., 2010).

جدول ۳- مؤلفه‌های اندازه‌گیری شده فلورسانس کلروفیل و معادلات مربوط به آن‌ها

Table 3 - Measured components of chlorophyll fluorescence and their corresponding equations

پارامترها Parameters	مخفف Abbreviation	معادله Equation
فلورسانس متغیر Variable fluorescence	Fv	$F_m - F_0$
حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم II Maximum photochemical quantum yield of photosystem II	F_v/F_m	$(F_m - F_0)/F_m$
کارایی کوانتومی فتوشیمیایی موثر فتوسیستم II Effective photochemical quantum yield of photosystem II	Y(II)	$(F_m - F_t)/F_m'$
کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم شده فتوسیستم II Quantum yield of regulated energy dissipation	Y(NPQ)	$(F_t/F_m') - (F_t/F_m)$
کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم نشده فتوسیستم II Quantum yield of non-regulated energy dissipation	Y(NO)	F_t/F_m
خاموشی غیر فتوشیمیایی Non-photochemical quenching	NPQ	$(F_m - F_m')/F_m'$

(Klughammer & Schreiber, 2008).

پس از انجام آزمون بارتلت (Bartlett, 1937) جهت اطمینان از همگن بودن واریانس خطاهای آزمایشی (جدول ۴)، تجزیه مرکب داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS نسخه ۹/۴ انجام و مقایسه میانگین‌ها نیز با استفاده از آزمون چند دانم‌های دانکن با احتمال خطای ۵ درصد صورت گرفت.

نتایج و بحث

عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر منطقه، رژیم‌های آبیاری، عناصر ریزمغذی و سیتوکینین بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه با احتمال خطای یک درصد معنی‌دار شد (جدول ۴). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که عملکرد بیولوژیک ۲۲/۷۹ درصد و عملکرد دانه ۲۰/۷۳ درصد در منطقه همدان بیشتر از کرج بود. در میان تیمارهای آبیاری، با افزایش مقدار تنش خشکی، عملکرد بیولوژیک و دانه کاهش یافت و تیمار آبیاری در ۴۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس (نرمال)، عملکرد بیولوژیک را ۴۸/۴۳ درصد و عملکرد دانه را ۷۰/۸۰ درصد نسبت به تیمار آبیاری نرمال تا گرده‌افشانی و بعد از آن قطع کامل آبیاری افزایش داد. در تیمارهای عناصر ریزمغذی نانو، تیمار توام سه عنصر روی + آهن + سلنیوم، سبب افزایش عملکرد بیولوژیک (۵۶/۴۷ درصد) و عملکرد دانه (۵۴/۳۹ درصد) نسبت به تیمار شاهد شد. در محلول‌پاشی سیتوکینین نیز تیمار گرده‌افشانی + شیری‌شدن دانه، عملکرد بیولوژیک را (۶۱/۶۶ درصد) و عملکرد دانه را (۷۱/۵۶ درصد) نسبت به شاهد افزایش داد (جدول ۵). عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در منطقه همدان بیشتر از کرج بود، که گمان می‌رود به علت شرایط آب و هوایی مناسب و همچنین به علت وجود مواد آلی بیشتر در خاک این امر رخ داده است. تاثیر شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف بر گیاهان متفاوت است، این تاثیر ناشی از میزان بارندگی، نوع آب و هوا و میزان رطوبت نسبی هوا می‌باشد که هرکدام از این عوامل تاثیر به‌سزایی در رشد گیاهان دارد. از طرف دیگر، مواد آلی موجود در خاک در دو منطقه تحقیق متفاوت بود که از طریق رابطه آب و خاک و گیاه می‌توان به اختلاف دو منطقه و تاثیر آن بر عملکرد گیاه پی برد (Pequeno et al., 2021). تنش خشکی موجب کاهش عملکرد گندم شد. عموماً گیاهان یکساله با قابلیت تولید بذری (مانند گندم) در مراحل اولیه گلدهی نسبت به خشکی حساس می‌باشند، چنانچه غلات در مراحل اولیه رشد زایشی تحت تنش قرار گیرند، عملکرد دانه آن‌ها به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد که احتمالاً در این حالت تقسیم میوز دچار اختلال شده و تولید گرده‌های سالم کاهش می‌یابد و در نهایت عملکرد دانه تحت تاثیر قرار می‌گیرد (Si et al., 2020). Raza و همکاران (۲۰۲۰)، بیان کردند که تنش خشکی در مرحله پنجه‌زنی عملکرد بیولوژیک و دانه گندم را کاهش داد و کاربرد سیتوکینین موجب افزایش عملکرد گندم شد، که با نتایج حاصل از مطالعه حاضر مطابقت داشت. همچنین ثابت شده است که تنش خشکی در طول گلدهی و پر شدن دانه می‌تواند عملکرد گندم را به شدت کاهش دهد (Farooq et al., 2014). علاوه بر این، تنش خشکی ساختار کلروپلاست را مختل می‌کند، فعالیت آنزیم‌های کلیدی مرتبط با فتوسنتز را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش ظرفیت فتوسنتزی می‌شود و بر توزیع و انتقال مواد فتوسنتزی تأثیر می‌گذارد و در نهایت منجر به کاهش عملکرد می‌شود (Castañeda-Murillo et al., 2022). کاربرد سیتوکینین عملکرد گندم را بهبود بخشید. سیتوکینین باعث افزایش زتاتین ریوزید و تولید IAA می‌شود، بنابراین به کاهش تنش خشکی کمک می‌کند (Yang et al., 2021). عناصر ریزمغذی نقش اساسی را در رشد و عملکرد دانه گندم ایفا می‌کنند. کود نانو دارای سطح وسیع و اندازه ذرات کمتری نسبت به اندازه منافذ برگ گیاه است که به بافت‌های گیاه بهتر نفوذ کرده و باعث جذب بهتر مواد مغذی می‌شود و با ایجاد

شرایط مناسب برای رشد گندم، سبب بهبود رشد گیاه و در نهایت منجر به افزایش عملکرد بیولوژیک و دانه می‌شود (Dimkpa & Bindraban, 2016). سلیوم از طریق تحریک رشد ریشه، افزایش جذب آب ریشه‌ها و فراهمی بالاتر رطوبت خاک موجب افزایش عملکرد خصوصا در شرایط کاربرد توأم با عناصر آهن و روی شده است. گزارش شده است که محلول‌پاشی سلیوم، ظرفیت تبادل کاتیونی، ظرفیت نگهداری آب در خاک، جذب، نگهداری و انتقال عناصر در گیاه را افزایش می‌دهد. اثر مثبت سلیوم بر عملکرد گندم می‌تواند به علت فراهمی نیتروژن و جلوگیری از آبسویی آن نسبت داده شود (Jameson & Song, 2020).

جدول ۴- نتایج تجزیه واریانس صفات عملکرد، رطوبت نسبی برگ، شاخص کلروفیل و برخی پارامترهای فلورسانس

کلروفیل گندم

Table 4- Analysis variance results of yield traits, leaf relative humidity, chlorophyll index and some chlorophyll fluorescence parameters of wheat

منابع تغییرات S.O.V.	درجه آزادی d.f	Mean of Squares						
		عملکرد بیولوژیک Biological yield	عملکرد دانه Grain yield	رطوبت نسبی برگ RWC	شاخص کلروفیل Chlorophyll index	فلورسان س کمینه F0	فلورسانس بیشینه Fm	فلورسانس بیشینه در حالت اشباع Fm'
Place (P)	1	964.75**	364.97**	159.66**	95.42**	72.83**	174.83**	135.79**
تکرار در منطقه	4	13.11	10.84	12.32	16.58	12.43	16.48	4.33
Replication in P								
Irrigation (I)	2	673.94**	419.11**	167.01**	117.70**	53.76**	208.65**	367.17**
P × I	2	19.72 ^{ns}	32.70 ^{ns}	19.43 ^{ns}	11.36 ^{ns}	9.88 ^{ns}	10.74 ^{ns}	16.59 ^{ns}
Error	8	28.70	21.56	21.67	17.93	10.17	12.70	13.18
عناصر ریز مغذی	4	751.19**	358.72**	189.73*	96.88*	69.07*	113.52*	10.14*
Nano-micronutrients (B)								
P × B	4	12.70 ^{ns}	15.74 ^{ns}	5.26 ^{ns}	8.52 ^{ns}	3.26 ^{ns}	5.70 ^{ns}	2.52 ^{ns}
Cytokinin (C)	3	515.83**	276.30**	109.56**	83.66**	83.34*	74.92*	15.62*
P × C	3	14.61 ^{ns}	19.47 ^{ns}	8.84 ^{ns}	9.43 ^{ns}	6.05 ^{ns}	7.05 ^{ns}	1.10 ^{ns}
I × B	8	20.73 ^{ns}	10.53 ^{ns}	9.23 ^{ns}	8.12 ^{ns}	5.81 ^{ns}	3.78 ^{ns}	2.58 ^{ns}
P × I × B	8	23.84 ^{ns}	42.11 ^{ns}	13.48 ^{ns}	11.52 ^{ns}	6.39 ^{ns}	6.09 ^{ns}	3.21 ^{ns}
I × C	6	15.66 ^{ns}	38.05 ^{ns}	10.74 ^{ns}	12.89 ^{ns}	5.24 ^{ns}	5.64 ^{ns}	2.33 ^{ns}
P × I × C	6	16.32 ^{ns}	22.91 ^{ns}	12.01 ^{ns}	11.03 ^{ns}	7.42 ^{ns}	6.85 ^{ns}	2.18 ^{ns}
B × C	12	19.87 ^{ns}	15.34 ^{ns}	10.95 ^{ns}	11.46 ^{ns}	6.60 ^{ns}	4.28 ^{ns}	1.35 ^{ns}
P × B × C	12	26.40 ^{ns}	19.56 ^{ns}	13.18 ^{ns}	12.58 ^{ns}	7.18 ^{ns}	3.12 ^{ns}	2.67 ^{ns}
I × B × C	24	11.71 ^{ns}	26.27 ^{ns}	14.58 ^{ns}	10.73 ^{ns}	6.27 ^{ns}	3.58 ^{ns}	1.12 ^{ns}
P × I × B × C	24	15.46 ^{ns}	23.48 ^{ns}	16.73 ^{ns}	12.34 ^{ns}	5.90 ^{ns}	2.97 ^{ns}	1.19 ^{ns}
Error	228	21.19	15.80	12.46	14.94	8.21	10.22	7.89
C.V		11.75	13.41	10.49	13.62	10.12	8.43	5.65

** و * به ترتیب معنی‌دار با احتمال خطای یک و پنج درصد، ns فاقد اثر معنی‌دار.

ns: not significant, * and **: significant at 5% and 1% levels of probability, respectively.

جدول ۵- نتایج مقایسه میانگین صفات عملکرد، رطوبت نسبی برگ، شاخص کلروفیل و برخی پارامترهای فلورسانس کلروفیل گندم

Table 5- Results of comparison of average yield traits, leaf relative humidity, chlorophyll index and some chlorophyll fluorescence parameters of wheat

تیمارها treatments	عملکرد بیولوژیک Biological yield (ton.ha ⁻¹)	عملکرد دانه Grain yield (ton.ha ⁻¹)	رطوبت نسبی برگ RWC (%)	شاخص کلروفیل Chlorophyll index	فلورسانس کمین F ₀	فلورسانس بیشینه F _m	فلورسانس بیشینه در حالت اشباع F _{m'}
مکان منطقه Hamadan	27.58 ^a	10.83 ^a	70.65 ^a	34.86 ^a	21.69 ^a	9.65 ^a	55.72 ^a
Karaj	22.46 ^b	8.97 ^b	63.47 ^b	27.52 ^b	17.80 ^b	7.43 ^b	51.67 ^b
آبیاری Irrigation							
I ₁	26.48 ^a	11.29 ^a	74.53 ^a	34.79 ^a	23.75 ^a	10.42 ^a	58.49 ^a
I ₂	23.05 ^b	8.73 ^b	68.81 ^b	25.54 ^b	16.93 ^b	8.38 ^b	43.17 ^b
I ₃	17.84 ^c	6.61 ^c	52.94 ^c	19.28 ^c	14.26 ^c	6.64 ^b	48.72 ^c
رزمغذی Micronutrients							
Zinc+ Iron+Selenium	29.01 ^a	11.78 ^a	72.43 ^a	33.97 ^a	22.87 ^a	9.61 ^a	57.24 ^a
روی + آهن + سلنیوم Zinc	26.18 ^b	10.23 ^b	66.89 ^b	29.48 ^c	21.56 ^b	7.75 ^b	52.82 ^b
روی Iron	25.95 ^b	10.51 ^b	62.45 ^c	32.85 ^b	20.31 ^b	7.94 ^b	52.35 ^b
سelenium	25.42 ^b	9.02 ^c	59.33 ^d	26.73 ^d	20.45 ^b	7.38 ^b	52.98 ^b
شاهد Control	18.54 ^c	7.63 ^d	51.72 ^e	18.10 ^e	15.68 ^c	6.03 ^c	48.27 ^c
سیتوکینین Cytokinin							
Flowering stage + Milking development	28.42 ^a	12.25 ^a	73.21 ^a	31.52 ^a	22.61 ^a	10.11 ^a	52.48 ^a
گلدهی + شیر شدن Milking	25.73 ^b	10.31 ^b	66.45 ^b	28.49 ^b	20.28 ^b	8.62 ^b	50.69 ^b
مرحله شیر شدن Anthesis	21.96 ^c	8.66 ^c	61.84 ^c	22.67 ^c	17.95 ^c	6.84 ^c	48.15 ^c
مرحله گلدهی Control	17.58 ^d	7.14 ^d	57.20 ^d	19.34 ^d	15.63 ^d	6.32 ^c	47.37 ^c

در هر ستون و برای هر عامل میانگین‌های دارای حروف مشترک فاقد تفاوت معنی‌دار هستند (آزمون دانکن با احتمال خطای پنج درصد)

Means with similar letters in each column and each factors are not significantly different at 5% probability level.

I₁: شاهد، I₂: آبیاری نرمال تا گردهافشانی و بعد از آن آبیاری در ۶۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس، I₃: آبیاری نرمال تا گردهافشانی و بعد از آن قطع کامل آبیاری

I₁: Normal irrigation, I₂: Normal irrigation from planting date to pollination stage and irrigation at 60% available moisture discharge afterward, I₃: Normal irrigation in from planting date to pollination stage then with holding cut off irrigation

رطوبت نسبی برگ و شاخص کلروفیل

اثر منطقه، آبیاری، عناصر ریزمغذی و اثر سیتوکینین با احتمال خطای یک درصد بر رطوبت نسبی برگ و شاخص کلروفیل معنی‌دار شد (جدول ۴). مطابق با نتایج مقایسه میانگین، رطوبت نسبی برگ و شاخص کلروفیل به ترتیب ۱۱/۳۱ درصد و ۲۶/۶۷ درصد در همدان بیشتر از کرج بود. با اعمال تنش خشکی، رطوبت نسبی برگ و شاخص کلروفیل کاهش یافت. تیمار آبیاری در ۴۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس (نرمال)، موجب افزایش رطوبت نسبی برگ ۴۰/۷۸ درصد و شاخص کلروفیل ۸۰/۴۴ درصد نسبت به تیمار آبیاری نرمال تا گردهافشانی و بعد از آن قطع کامل آبیاری شد. در تیمارهای عناصر ریزمغذی نانو، تیمار توام سه عنصر روی + آهن + سلنیوم، سبب بهبود رطوبت نسبی برگ ۴۰/۰۴ درصد و شاخص

کلروفیل ۸۷/۶۷ درصد نسبت به تیمار شاهد شد. در محلول پاشی سیتوکینین نیز تیمار گرده افشانی + شیری شدن دانه، سبب افزایش رطوبت نسبی برگ ۲۷/۹۸ درصد و شاخص کلروفیل ۶۲/۹۷ درصد نسبت به شاهد (جدول ۵). باید توجه داشت که عدد کلروفیل متر مقدار کلروفیل را مشخص نمی‌کند، بلکه تخمینی از غلظت کلروفیل را نشان می‌دهد. این عدد همبستگی بالایی با مقدار کلروفیل برگ دارد. فتوسنتز یک سیستم تبدیل انرژی و متابولیک حیاتی در رشد و نمو محصولات کشاورزی است. افزایش ظرفیت فتوسنتزی برای ایجاد پایه و اساس رشد گیاه، تجمع ماده خشک و پر شدن دانه که اساس تشکیل عملکرد محصول هستند، حائز اهمیت است (Lai et al., 2024). به نظر می‌رسد کاهش کلروفیل در اثر تنش خشکی، به علت افزایش تولید رادیکال‌های اکسیژن باشد، که این رادیکال‌های آزاد سبب پراکسیداسیون و در نتیجه تجزیه رنگیزه می‌شوند. بر اثر تنش خشکی، محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی، (کلروفیل‌های a و b) در برگ‌ها کاهش می‌یابد. شرایط تنش خشکی گیاه اثرات مهمی بر کلروفیل دارد و تنش خشکی از طریق افزایش فعالیت آنزیم‌های کلروفیل‌لاز و پراکسیداز در گیاهان، منجر به تخریب کلروپلاست و کاهش محتوای کلروفیل می‌شود. کاهش میزان کلروفیل به دلیل تنش خشکی با افزایش رادیکال‌های اکسیژن در سلول‌ها مرتبط است (Askari et al., 2017). نتایج مطالعات سایر محققان نشان داد که تنش خشکی به طور قابل توجهی محتوای کلروفیل را کاهش داد و منجر به تولید اکسیژن فعال شد که با اجزای مختلف سلولی، به ویژه لیپیدهای غشایی، واکنش می‌دهد و به غشاهای فتوسنتزی آسیب می‌رساند و مهار نوری را تشدید می‌کند (Kruk & Szymańska, 2021; Hlahla et al., 2024). عناصر ریزمغذی سبب افزایش کلروفیل شدند. آهن در سنتز کلروفیل نقش به سزایی دارد و می‌توان گفت علت افزایش کلروفیل نقش آهن در تولید و ساخت اجزای کلروپلاست و به ویژه انتقال الکترون است. آهن به عنوان جزئی از گروه کاتالیزوری، بسیاری از آنزیم‌های اکسیداسیون و احیا که در فتوسنتز، تنفس و تثبیت نیتروژن نقش دارند، اهمیت دارد (Adil et al., 2022). محتوای نسبی آب برگ شاخص مناسبی برای بیان وضعیت آبی گیاه است و در واقع به عنوان شاخصی برای نشان دادن آسیب‌های ناشی از تنش خشکی معرفی شده است. محتوای نسبی آب بیشتر باعث افزایش میزان فتوسنتز و در نتیجه افزایش عملکرد در شرایط تنش می‌شود. حفظ محتوای آب نسبی برگ به معنای توانایی برگ در حفظ مقادیر بیشتری آب در شرایط تنش است که از طریق قابلیت تنظیم اسمزی و یا توانایی ریشه در جذب آب حاصل می‌شود (Cappelli et al., 2020). در پژوهش حاضر نیز، در شرایط کمبود آب و قطع آبیاری، رطوبت نسبی برگ‌ها کاهش پیدا کرد. کاهش محتوای آب نسبی برگ و بسته شدن روزنه‌ها، اولین تاثیر تنش خشکی بوده که از طریق اختلال در سیستم ساخت مواد فتوسنتزی موجب کاهش میزان عملکرد می‌شود. تحت شرایط تنش خشکی، گیاه روزنه‌های خود را می‌بندد. در نتیجه، میزان دی اکسید کربن درون سلولی کاهش می‌یابد، که این منجر به کاهش میزان فشار آماس در اثر کاهش فتوسنتز در برگ می‌شود (Wasaya et al., 2021). گزارش شد که عناصر ریزمغذی آهن، روی و مس موجب افزایش رطوبت نسبی برگ و کلروفیل گندم شد که نتایج حاضر با پژوهش سایر محققان مطابقت داشت (Adil et al., 2022).

فلورسانس کمینه، بیشینه و فلورسانس بیشینه در حالت اشباع

اثر منطقه و رژیم‌های آبیاری با احتمال خطای یک درصد، اثر عناصر ریزمغذی و سیتوکینین با احتمال خطای پنج درصد بر فلورسانس کمینه، بیشینه و فلورسانس بیشینه در حالت اشباع معنی‌دار شد (جدول ۴). نتایج نشان داد که فلورسانس کمینه ($21/85$ درصد)، فلورسانس بیشینه ($29/87$ درصد) و فلورسانس بیشینه در حالت اشباع ($7/83$ درصد) در منطقه همدان بیشتر از کرج بود. در میان تیمارهای آبیاری، تیمار آبیاری در 40 درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس (نرمال) موجب افزایش فلورسانس کمینه ($52/52$ درصد)، فلورسانس بیشینه ($56/92$ درصد) و فلورسانس بیشینه در حالت اشباع ($20/05$ درصد) نسبت به تیمار آبیاری نرمال تا گرده‌افشانی و بعد از آن قطع کامل آبیاری شد. در تیمارهای عناصر ریزمغذی نانو، تیمار توام سه عنصر روی + آهن + سلنیوم، سبب افزایش فلورسانس کمینه ($45/85$ درصد)، فلورسانس بیشینه ($59/36$ درصد) و فلورسانس بیشینه در حالت اشباع ($18/58$ درصد) نسبت به تیمار شاهد شد. در محلول‌پاشی سیتوکینین نیز تیمار گرده‌افشانی + شیری شدن دانه، فلورسانس کمینه ($44/65$ درصد)، فلورسانس بیشینه ($59/96$ درصد) و فلورسانس بیشینه در حالت اشباع ($10/78$ درصد) را نسبت به شاهد افزایش داد (جدول ۵). وقتی مولکول‌های کوئینون در وضعیت اکسید شده هستند، در این حالت سیستم دارای کمترین فلورسانس (F_0) است. به تدریج، با افزایش درجه احیا شدن، فلورسانس افزایش می‌یابد. این فرآیند تا احیای کامل ادامه یافته و مراکز احیای فتوسیستم II به تدریج بسته می‌شوند و انتقال الکترون به فتوسیستم I صورت نمی‌گیرد. در این حالت فلورسانس کلروفیل افزایش می‌یابد و مراکز فتوسیستم دارای بیشترین فلورسانس (F_m) هستند. در واقع تنش خشکی و افزایش شدت آن با تأثیر منفی بر ظرفیت پذیرش و انتقال الکترون، باعث شد سیستم به سرعت به F_m برسد. افزایش در مقدار F_0 و کاهش در F_m ، فعالیت فتوسیستم II را مختل می‌کند. افت F_m ممکن است با کاهش فعالیت کمپلکس آنزیم تجزیه‌کننده آب و همچنین چرخه انتقال الکترون در درون یا اطراف فتوسیستم II مرتبط باشد (Thakur et al., 2025; Paknejad et al., 2007). همراستا با نتایج حاصل از پژوهش حاضر، گزارش شده است که تنش خشکی موجب کاهش فلورسانس کمینه، بیشینه و فلورسانس بیشینه در حالت اشباع گندم شده است (Ali et al., 2023). از طرف دیگر، کاربرد هورمون سیتوکینین و همچنین عناصر ریزمغذی با بهبود شرایط تغذیه‌ای و رشد گیاه سبب اثر مثبت بر ظرفیت پذیرش و انتقال الکترون شد که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت (Thakur et al., 2025). هرچه فلورسانس کلروفیل کمتر باشد، گیاهان مقاومت بیشتری به تنش نشان می‌دهند، زیرا از نور دریافتی خورشید، حداکثر استفاده را می‌نمایند و کمتر آن را بازتاب و هدر می‌دهند (Sommer et al., 2023). همچنین پیرو نتایج حاصل از مطالعه حاضر، گزارش شده است که محلول‌پاشی روی و آهن با بهبود شرایط فتوسنتز و افزایش عملکرد گیاه موجب کاهش فلورسانس کمینه، فلورسانس بیشینه و فلورسانس بیشینه در حالت اشباع در گندم شده است (Mannan et al., 2022).

فلورسانس پایدار و متغیر

اثر منطقه، آبیاری، عناصر ریزمغذی و اثر سیتوکینین با احتمال خطای یک درصد بر فلورسانس پایدار و متغیر معنی‌دار شد (جدول ۶). مطابق با نتایج مقایسه میانگین، فلورسانس پایدار و متغیر به ترتیب $7/33$ درصد و $10/72$ درصد در همدان بیشتر از کرج بود. با اعمال تنش خشکی، رطوبت فلورسانس پایدار و متغیر کاهش یافت. تیمار آبیاری در 40 درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس (نرمال)، موجب افزایش فلورسانس پایدار $26/68$ درصد و شاخص فلورسانس متغیر $24/78$ درصد نسبت به تیمار آبیاری نرمال تا گرده‌افشانی و بعد از آن قطع کامل آبیاری شد. در تیمارهای عناصر

ریزمغذی نانو، تیمار توام سه عنصر روی + آهن + سلنیوم، سبب بهبود فلورسانس پایدار ۲۶/۱۶ درصد و فلورسانس متغیر ۲۱/۴۸ درصد نسبت به تیمار شاهد شد. در محلول پاشی سیتوکینین نیز تیمار گرده افشانی + شیری شدن دانه، فلورسانس پایدار ۱۵/۳۴ درصد و فلورسانس متغیر ۲۰/۷۴ درصد نسبت به شاهد افزایش یافت (جدول ۷). بهبود فتوسنتز به واسطه مصرف سیتوکینین و عناصر ریزمغذی تحت تنش ممکن است به دلیل اثر این مواد در حفظ کلروفیل برگ باشد. به نظر می رسد سیتوکینین و عناصر ریزمغذی دارای اثرات بازدارنده ای بر کارکرد دستگاه فتوسنتز باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان چنین استنباط نمود که کاهش میزان عملکرد کوانتوم فتوسیستم II عمدتاً به خاطر وقوع آشفته گی در کلروپلاست بوده و کاهش کلروفیل نیز این موضوع را تأیید می کند، زیرا فلورسانس کلروفیل به طور مستقیم به فعالیت کلروفیل در واکنش فتوسیستمها ارتباط داشته و می توان از آن به عنوان معیاری برای اندازه گیری کارایی فتوسیستم نام برد. در مطالعه حاضر با افزایش شدت تنش خشکی مقدار فلورسانس متغیر (F_v) کاهش یافت. اصولاً هنگامی که پذیرنده الکترون (کوئینون) در حالت احیا باشد مقدار فلورسانس کلروفیل زیاد است و به این علت مقدار F_v نیز در این حالت زیاد می شود؛ ولی زمانی که کوئینون در حالت اکسید است مقدار فلورسانس کلروفیل a کم می شود؛ در نتیجه، میزان F_v کاهش می یابد. تنش های محیطی، مقدار F_v را به علت ممانعت از فتواکسیداسیون فتوسیستم II کاهش می دهد. از آنجاکه فلورسانس متغیر F_v نشان دهنده احیای کامل پذیرنده الکترون Q_A است؛ بنابراین نتیجه گیری می شود تنش خشکی در انتقال الکترون به فتوسیستم I اختلال ایجاد کرده است (Katherine et al., 2023; Paknejad et al., 2007). در همین راستا پژوهشگران اعلام کردند که تنش خشکی موجب کاهش فلورسانس پایدار و متغیر شد که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت (Thakur et al., 2025).

جدول ۶- نتایج تجزیه واریانس سایر پارامترهای فلورسانس کلروفیل گندم

Table 6- Analysis variance results of other chlorophyll fluorescence parameters of wheat

منابع تغییرات S.O.V	درجه آزادی d.f	Mean of Squares						
		فلورسانس پایدار Ft	فلورسانس متغیر Fv	حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم II Fv/Fm	کارایی کوانتومی فتوشیمیایی موثر فتوسیستم II Y (II)	کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم شده فتوسیستم II Y(NPQ)	کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم نشده فتوسیستم II Y (NO)	خاموشی غیر فتوشیمیایی NPQ
Place (P) منطقه	1	946.83**	2251.8 ^{ns}	1.02 ^{ns}	0.94 ^{ns}	0.26 ^{ns}	0.15 ^{ns}	1.88**
تکرار در منطقه	4	14.67	105.72	1.67	0.33	0.45	0.13	5.96
Replication in P								
Irrigation (I) آبیاری	2	863.64**	3264.7**	8.35**	2.56**	0.73**	0.48*	16.23**
P × I	2	32.80 ^{ns}	137.82 ^{ns}	5.02 ^{ns}	0.12 ^{ns}	0.001 ^{ns}	0.12 ^{ns}	3.17 ^{ns}
Error خطا	8	21.76	97.63	2.01	0.56	0.21	0.30	4.22
عناصر ریزمغذی	4	958.17**	1823.4**	3.90*	1.72*	1.18*	0.91*	10.73*
Nano-micronutrients (B)								
P × B	4	16.70 ^{ns}	110.79 ^{ns}	0.16 ^{ns}	0.34 ^{ns}	0.007 ^{ns}	0.027 ^{ns}	1.22 ^{ns}
Cytokinin (C) سیتوکینین	3	313.73**	2138.1**	4.98**	1.66**	0.97**	0.82*	9.75*

P × C	3	8.14 ^{ns}	111.35 ^{ns}	0.24 ^{ns}	0.13 ^{ns}	0.005 ^{ns}	0.63 ^{ns}	0.92 ^{ns}
I × B	8	46.78 ^{ns}	91.70 ^{ns}	0.57 ^{ns}	0.008 ^{ns}	0.006 ^{ns}	0.018 ^{ns}	1.01 ^{ns}
P × I × B	8	15.09 ^{ns}	126.18 ^{ns}	0.84 ^{ns}	0.14 ^{ns}	0.002 ^{ns}	0.014 ^{ns}	1.07 ^{ns}
I × C	6	19.05 ^{ns}	97.32 ^{ns}	0.72 ^{ns}	0.21 ^{ns}	0.003 ^{ns}	0.011 ^{ns}	1.24 ^{ns}
P × I × C	6	32.80 ^{ns}	84.15 ^{ns}	0.30 ^{ns}	0.09 ^{ns}	0.005 ^{ns}	0.008 ^{ns}	1.18 ^{ns}
B × C	12	18.64 ^{ns}	114.97 ^{ns}	0.61 ^{ns}	0.03 ^{ns}	0.0004 ^{ns}	0.006 ^{ns}	1.02 ^{ns}
P × B × C	12	15.12 ^{ns}	101.74 ^{ns}	0.95 ^{ns}	0.02 ^{ns}	0.002 ^{ns}	0.009 ^{ns}	0.97 ^{ns}
I × B × C	24	17.64 ^{ns}	95.63 ^{ns}	0.68 ^{ns}	0.007 ^{ns}	0.0006 ^{ns}	0.005 ^{ns}	1.25 ^{ns}
P × I × B × C	24	21.23 ^{ns}	89.04 ^{ns}	0.23 ^{ns}	0.009 ^{ns}	0.0008 ^{ns}	0.007 ^{ns}	1.73 ^{ns}
Error خطا	228	16.84	91.67	1.18	0.42	0.10	0.16	2.34
C.V		8.43	10.83	8.96	5.32	7.20	6.17	7.46

*** و * به ترتیب معنی‌دار با احتمال خطای یک و پنج درصد، ns فاقد اثر معنی‌دار.

ns: not significant, * and **: significant at 5% and 1% levels of probability, respectively

جدول ۷- نتایج مقایسه میانگین سایر پارامترهای کلروفیل گندم

Table 7- Results of comparison of other chlorophyll fluorescence parameters of wheat

تیمارها treatments	فلورسانس پایدار Ft	فلورسانس متغیر Fv	حداکثر کارایی کوانتومی فتوشیمیایی فوتوسیسستم II Fv/Fm	کارایی کوانتومی فتوشیمیایی فوتوسیسستم II Y (II)	کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم شده فوتوسیسستم II Y(NPQ)	کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم نشده فوتوسیسستم II Y (NO)	خاموشی غیر فتوشیمیایی NPQ
محل منطقه Hamadan همدان	487.65 ^a	1958.43 ^a	0.86 ^a	0.42 ^a	0.34 ^a	0.16 ^a	2.26 ^a
Karaj کرج	454.31 ^b	1768.79 ^b	0.87 ^a	0.45 ^a	0.33 ^a	0.17 ^a	2.35 ^a
آبیاری Irrigation							
I ₁	542.71 ^a	2163.38 ^a	0.89 ^a	0.35 ^c	0.37 ^c	0.15 ^b	2.40 ^c
I ₂	497.26 ^b	1946.74 ^b	0.86 ^b	0.41 ^b	0.43 ^b	0.21 ^a	3.18 ^b
I ₃	428.39 ^c	1733.67 ^b	0.76 ^c	0.52 ^a	0.54 ^a	0.23 ^a	4.35 ^a
ریزمغذی Micronutrients							
Zinc+ Iron+Selenium روی+آهن+سلنیوم	550.43 ^a	2179.84 ^a	0.87 ^a	0.31 ^c	0.38 ^c	0.16 ^c	1.85 ^c
Zinc روی	483.38 ^c	1963.04 ^b	0.81 ^b	0.42 ^b	0.43 ^b	0.21 ^b	2.41 ^b
Iron آهن	511.07 ^b	1942.55 ^b	0.82 ^b	0.39 ^c	0.44 ^b	0.22 ^b	2.34 ^b
Selenium سلنیوم	467.81 ^d	1926.87 ^b	0.80 ^b	0.45 ^b	0.45 ^b	0.21 ^b	2.28 ^b
Control شاهد	436.28 ^e	1794.39 ^d	0.72 ^c	0.53 ^a	0.51 ^a	0.26 ^a	3.04 ^a
سیتوکینین Cytokinin							
Flowering stage + Milking گلدهی+شیری شدن	516.94 ^a	2123.64 ^a	0.87 ^a	0.29 ^d	0.35 ^b	0.16 ^b	2.48 ^b
Milking مرحله شیری شدن	492.35 ^a	2190.21 ^a	0.86 ^a	0.34 ^c	0.36 ^b	0.17 ^b	2.34 ^b
Anthesis مرحله گلدهی	456.28 ^b	1743.69 ^b	0.76 ^b	0.42 ^b	0.49 ^a	0.23 ^a	3.57 ^a
Control شاهد	448.17 ^b	1758.72 ^d	0.75 ^b	0.50 ^a	0.48 ^a	0.25 ^a	3.61 ^a

در هر ستون و برای هر عامل میانگین‌های دارای حروف مشترک فاقد تفاوت معنی‌دار هستند (آزمون دانکن با احتمال خطای پنج درصد)

Means with similar letters in each column and each factors are not significantly different at 5% probability level.

I₁: شاهد، I₂: آبیاری نرمال تا گردهافشانی و بعد از آن آبیاری در ۶۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس، I₃: آبیاری نرمال تا گردهافشانی و بعد از آن قطع کامل آبیاری
 I₁: Normal irrigation, I₂: Normal irrigation from planting date to pollination stage and irrigation at 60% available moisture discharge afterward, I₃: Normal irrigation in from planting date to pollination stage then with holding cut off irrigation

کارایی کوانتومی فتوسیستم

اثر آبیاری، عناصر ریزمغذی و اثر سیتوکینین با احتمال خطای یک درصد بر فلورسانس پایدار و متغیر معنی دار شد (جدول ۶). با اعمال تنش خشکی و افزایش شدت آن، حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم II، کاهش یافت. تیمار آبیاری در ۴۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس (نرمال)، موجب افزایش حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم II، (۱۷/۱۰ درصد) نسبت به تیمار آبیاری نرمال تا گردهافشانی و بعد از آن قطع کامل آبیاری شد. در تیمارهای عناصر ریزمغذی نانو، تیمار توام سه عنصر روی + آهن + سلنیوم، موجب افزایش حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم II، (۲۰/۸۳ درصد) نسبت به تیمار شاهد شد. در محلول پاشی سیتوکینین نیز تیمار گرده افشانی + شیرین شدن دانه، و همچنین تیمار مرحله شیرین شدن سبب افزایش حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم II، (۱۶ درصد) نسبت به شاهد و تیمار مرحله گلدهی شد (جدول ۷). علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که اعمال تنش خشکی و افزایش شدت آن سبب افزایش کارایی کوانتومی فتوشیمیایی موثر فتوسیستم II، کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم شده فتوسیستم II، کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم نشده فتوسیستم II، خاموشی غیر فتوشیمیایی نسبت به آبیاری نرمال شد. تیمار آبیاری نرمال تا گردهافشانی و بعد از آن قطع کامل آبیاری سبب افزایش کارایی کوانتومی فتوشیمیایی موثر فتوسیستم II (۴۸/۵۷ درصد)، کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم شده فتوسیستم II (۴۵/۸۴ درصد)، کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم نشده فتوسیستم II (۵۳/۳۳ درصد)، خاموشی غیر فتوشیمیایی (۸۱/۲۵ درصد)، نسبت به تیمار آبیاری در ۴۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس (نرمال) شد. در میان تیمارهای عناصر ریزمغذی نانو، تیمار شاهد موجب افزایش کارایی کوانتومی فتوشیمیایی موثر فتوسیستم II (۷۰/۹۶ درصد)، کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم شده فتوسیستم II (۳۴/۲۱ درصد)، کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم نشده فتوسیستم II (۶۲/۵ درصد)، خاموشی غیر فتوشیمیایی (۶۴/۳۲ درصد)، نسبت به تیمار توام سه عنصر روی + آهن + سلنیوم شد. در میان تیمارهای سیتوکینین نیز تیمار شاهد افزایش کارایی کوانتومی فتوشیمیایی موثر فتوسیستم II (۷۲/۴۱ درصد)، کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم شده فتوسیستم II (۳۷/۱۴ درصد)، کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم نشده فتوسیستم II (۵۶/۲۵ درصد)، خاموشی غیر فتوشیمیایی (۴۷/۵۶ درصد)، نسبت به تیمار محلول پاشی سیتوکینین نیز تیمار گرده افشانی + شیرین شدن دانه را به همراه داشت (جدول ۸). هرچه میزان ساخت کلروفیل کمتر باشد، برگ‌ها نسبت به بازدارندگی نوری آسیب پذیرتر هستند، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، تنش خشکی باعث کاهش کلروفیل شد و کاربرد سیتوکینین و همچنین عناصر ریزمغذی نانو، میزان کلروفیل گندم را افزایش داد که می‌توان بیان کرد که در تیمارهای فوق برگ‌ها آسیب‌پذیری کمتری دارند و فتوستنتز بهتری رخ داده است (Zhang et al., 2025). در تیمارهای دارای تنش خشکی، یکی از دلایل کاهش فلورسانس و پتانسیل عملکرد کوانتوم (Fv/Fm) افزایش بازدارندگی نوری به دلیل کاهش کلروفیل در این تیمارها است. تنش خشکی باعث افزایش F₀ و کاهش نسبت کلروفیل فلورسانس، F_m و Fv/Fm شد. کاهش محتوای کلروفیل در تیمارهای دارای تنش، نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در PSII به عنوان پیامد مکانیسم تطبیقی در

کلروپلاست‌ها به دلیل قرار گرفتن در معرض استرس است. افزایش F_0 و کاهش مقادیر F_v/F_m ممکن است نتیجه آسیب به مرکز واکنش PSII باشد که توانایی انتقال انرژی به مرکز واکنش را کاهش می‌دهد که نشان دهنده آن است که انتقال الکترون از فتوسیستم II به فتوسیستم I تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفته و کاهش یافته است. تنش خشکی باعث کاهش پایداری غشا اما افزایش نشت یون شد. این نتایج نشان می‌دهد که تنش خشکی تأثیر نامطلوبی بر پایداری غشا دارد و در نتیجه سلول‌ها به دلیل آسیب به غشاء، نشت یون بیشتری دارند (Sandoval *et al.*, 2024; Thakur *et al.*, 2025). در شرایط تنش خشکی تجمع QB غیراحیاء افزایش می‌یابد که این امر نشان‌دهنده عدم انتقال الکترون از QA احیا به QB است. در تنش خشکی شرایط تجمع QA نیز افزایش می‌یابد. علت ایا امر هنوز کاملاً مشخص نیست، ولی ممکن است کاهش آسیمیلاسیون CO_2 در اثر بسته شدن روزنه‌ها در شرایط تنش خشکی، منجر به مصرف نشدن محصولات حاصل از زنجیره انتقال الکترون ($NADPH$ و ATP) شده و از این طریق میزان فرودوکسین یا احیاء افزایش یافت و به دنبال افزایش فرودوکسین احیاء شده، تولید رادیکال‌های فعال افزایش یافت و از این طریق، تغییر و یا تخریب پروتئین‌های غشاء تیلاکوئید صورت گیرد. بنابراین تخریب پروتئین‌های غشاء تیلاکوئید، مانع انتقال الکترون از جایگاه پذیرنده فتوسیستم II می‌گردد و این امر موجب کاهش سرعت انتقال الکترون، افزایش فلورسانس کلروفیل و کاهش عملکرد فتوسیستم II می‌شود. تغییر میزان فعالیت فتوسیستم II و همچنین تخریب ساختمان پروتئین D1 موجود در فتوسیستم II، در نتیجه افزایش فلورسانس کلروفیل در شرایط تنش خشکی است. نتایج حاصل از پژوهش‌ها نشان داد که کمپلکس آزادکننده اکسیژن فتوسیستم II و مراکز واکنش فتوسیستم II تحت تنش خشکی تخریب می‌شوند. اثر تخریبی تنش خشکی بر پروتئین‌های D1 که در ساختمان فتوسیستم II قرار دارد نیز گزارش شده است (Thakur *et al.*, 2025; Katherine *et al.*, 2023). کاهش سرعت انتقال الکترون و عملکرد کوانتومی فتوسیستم II گیاه در شرایط تنش خشکی ممکن است به دلیل تخریب سیکل کالوین، به تأخیر افتادن احیاء کوئنون‌ها و همچنین تخریب زنجیره انتقال الکترون غشاء تیلاکوئید باشد (Tilahun & Sven, 2003).

همبستگی صفات

نتایج همبستگی صفات مورد مطالعه نشان داد که عملکرد دانه همبستگی منفی و معنی‌داری با صفات خاموشی غیر فتوشیمیایی ($-0/85$)، کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم نشده فتوسیستم II ($-0/74$)، کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم شده فتوسیستم II ($0/71$)، کارایی کوانتومی فتوشیمیایی موثر فتوسیستم II ($-0/75$)، داشت. علاوه بر این، عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی‌داری با صفات شاخص کلروفیل ($0/90$)، رطوبت نسبی برگ ($0/84$) و عملکرد بیولوژیک ($0/97$) داشت. عملکرد دانه بیشترین همبستگی مثبت و معنی‌دار را با عملکرد بیولوژیک داشت (جدول ۸). همبستگی بین صفات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا میزان و نوع رابطه بین دو یا چند صفت را معین می‌کند و زمانی که برای صفتی گزینش در نظر گرفته می‌شود، باید به تأثیر آن صفت بر صفات دیگر توجه شود. همبستگی مثبت بین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص کلروفیل و رطوبت نسبی برگ را می‌توان به این دلیل نسبت داد که این صفات به‌طور مستقیم بر بهره‌وری کلی گیاه تأثیر مثبت دارند و همچنین همبستگی منفی عملکرد دانه با صفات کارایی کوانتومی فتوسیستم ممکن است به این دلیل باشد که این صفات تأثیر منفی بر رشد گیاه

داشته و موجب اختلال در سیستم فتوسنتز و رشد گیاه می‌شوند (Ibrahim, 2019). سایر محققان نیز همبستگی مثبت و معنی‌داری را میان عملکرد دانه گندم و عملکرد بیولوژیک، شاخص کلروفیل و رطوبت نسبی برگ بیان کردند که با نتایج حاصل از پژوهش حاضر مطابقت داشت (Ullah *et al.*, 2021; Ibrahim, 2019).

نسخه پیش انتشار

جدول ۸- همبستگی صفات مورد مطالعه

Table 8- Correlation of studied traits

n=120														
	NPQ	Y (NO)	Y(NPQ)	Y (II)	Fv/Fm	F _t	F _v	F _m '	F _m	F ₀	Chl.I	RWC	BY	GY
NPQ	1	0.80**	0.82**	0.78**	-0.64**	-0.80**	-0.53*	-0.69*	-0.80**	-0.85**	-0.74**	-0.74**	-0.74**	-0.85**
Y (NO)		1	0.84**	0.81**	-0.71**	-0.63*	-0.41**	-0.65**	-0.75**	-0.58*	-0.68**	-0.68**	-0.68**	-0.74**
Y(NPQ)			1	0.85**	-0.80**	-0.75**	-0.62**	-0.70**	-0.77**	-0.71**	-0.73**	-0.73**	-0.73**	-0.71*
Y (II)				1	-0.69**	-0.66**	-0.61**	-0.68**	-0.60**	-0.69**	-0.77**	-0.77**	-0.77**	-0.75*
Fv/Fm					1	0.31	0.27	0.42	0.50	0.31	0.41	0.26	0.30	0.67*
F _t						1	0.35	0.35	0.47	0.27	0.34	0.28	0.44	0.52
F _v							1	0.34	0.31	0.30	0.40	0.30	0.35	0.43
F _m '								1	0.40	0.28	0.38	0.50	0.40	0.37
F _m									1	0.24	0.39	0.33	0.27	0.28
F ₀										1	0.42	0.28	0.39	0.40
Chl.I											1	0.88**	0.95**	0.90**
RWC												1	0.87**	0.84**
BY													1	0.97**
GY														1

*** و * به ترتیب معنی‌دار با احتمال خطای یک و پنج درصد و اعداد بدون علامت غیرمعنی‌دار می‌باشد.

Unsigned numbers are not significant, * and **: significant at 5% and 1% levels of probability, respectively.

NPQ: خاموشی غیر فتوشیمیایی، Y (NO): کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم نشده فتوسینتم II، Y (NPQ): کارایی کوانتومی غیر فتوشیمیایی تنظیم شده فتوسینتم II، Y (II): کارایی کوانتومی فتوشیمیایی موثر فتوسینتم II، Fv/Fm: حداکثر کارایی کوانتومی فتوسینتم II.

Fv: فلورسانس متغیر، Ft: فلورسانس پایدار، Fm': فلورسانس بیشینه در حالت اشباع، Fm: فلورسانس بیشینه، F0: فلورسانس کمینه، Chl.I: شاخص کلروفیل، RWC: رطوبت نسبی برگ، GY: عملکرد دانه، BY: عملکرد بیولوژیک.

نتیجه گیری کلی

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می‌توان اظهار داشت که تنش خشکی، اثر بازدارندگی بر فعالیت‌های مختلف دستگاه فتوسنتزی به خصوص فعالیت فتوسیستم II، در گندم دارد. در مطالعه حاضر مشخص شد که پارامترهای فلورسانس کلروفیل به همراه محتوای کلروفیل، نقش ویژه‌ای در بررسی اثرات تنش خشکی بر سیستم‌های فتوسنتزی گیاه دارند. بنابراین با اعمال تنش خشکی میزان تعرق، تبادلات گازی، حداکثر کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II، فلورسانس بیشینه (F_m) و سرعت فتوسنتز کاهش یافت. اما استفاده از هورمون سیتوکینین و کاربرد توأم عناصر ریزمغذی به طور معنی‌داری سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، شدت تعرق، حداکثر کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II، فلورسانس بیشینه (F_m)، فلورسانس کمینه (F_0)، رطوبت نسبی و محتوای کلروفیل را افزایش داد. شرایط آبیاری در ۴۰ درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس (نرمال)، موجب افزایش عملکرد گندم نسبت به سطوح تنش خشکی شد. به دلیل اینکه مرحله گلدهی گندم، حساس‌ترین مرحله رشدی به تنش خشکی است، لذا اعمال تنش خشکی در این مرحله توصیه نمی‌شود. کاربرد توأم عناصر ریزمغذی نانو (روی + آهن + سلنیوم) منجر به افزایش عملکرد گندم نسبت به کاربرد تک‌تک آن‌ها شد، لذا محلول‌پاشی توأم این سه عنصر برای افزایش عملکرد گندم توصیه می‌شود. محلول‌پاشی سیتوکینین در مرحله گرده افشانی + شیرازی دانه، عملکرد گندم را نسبت به مصرف در سایر مراحل افزایش داد، هرچند که منابع مختلف کاربرد عناصر تغذیه‌ای ریزمغذی نانو و محلول‌پاشی سیتوکینین را برای تحمل به تنش آبی مهم می‌دانند، اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در شرایط وجود تنش، این راهکارها برای کاهش اثرات منفی ناشی از تنش خشکی، قابل توصیه نمی‌باشد.

References

1. Adil, M., Bashir, S., Bashir, S., Aslam, Z., Ahmad, N., Younas, T., Asghar, R.M.A., Alkahtani, J., Dwiningasih, Y., & Elshikh, M.S. (2022). Zinc oxide nanoparticles improved chlorophyll contents, physical parameters, and wheat yield under salt stress. *Front. Plant Science*, 13, 932861. doi: 10.3389/fpls.2022.932861.
2. Agricultural Statistics. 2022-2023. *Ministry of Agriculture Jihad, Crops*, 1:100.
3. Ali, A., Ullah, Z., Sher, H. Abbas, Z., & Rasheed, A. (2023). Water stress effects on stay green and chlorophyll fluorescence with focus on yield characteristics of diverse bread wheat. *Planta*, 257, 104. <https://doi.org/10.1007/s00425-023-04140-0>
4. Anwar, S., Khalilzadeh, R., Khan, S., Nisa, Z., Bashir, R., Pirzad, A., & Malik, A. (2021). Mitigation of drought stress and yield improvement in wheat by zinc foliar spray relates to enhanced water use efficiency and zinc contents. *International Journal of Plant Production*, 15, 377–389. <https://doi.org/10.1007/s42106-021-00136-6>
5. Baker, N.R., & Rosenqvist, E. (2004). Applications of chlorophyll fluorescence can improve crop production strategies: an examination of future possibilities. *Journal of Experimental Botany*, 55, 1607-1621.
6. Bartlett, M.S. (1937). Properties of sufficiency and statistical tests. *Mathematical and Physical Sciences*, 160, 268-282.
7. Bhandari, R., Gnawali, S., Nyaupane, S., Kharel, S., Poudel, M., & Panth, P. (2021). Effect of drought and irrigated environmental condition on yield & yield attributing characteristic of bread wheat-A review. *Reviews in Food and Agriculture*, 2(2), 59–62. <https://doi.org/10.26480/rfna.02.2021.59.62>

8. Castañeda-Murillo, C.C., Rojas-Ortiz, J.G., Sánchez-Reinoso, A.D., Chávez-Arias, C.C., & Restrepo-Díaz, H. (2022). Foliar brassinosteroid analogue (DI-31) sprays increase drought tolerance by improving plant growth and photosynthetic efficiency in lulo plants. *Heliyon*, 8(2), 1-18. 10.1016/j.heliyon.2022.e08977
9. Cappelli, A., Bettaccini, L., & Cini, E. (2020). The kneading process: A systematic review of the effects on dough rheology and resulting bread characteristics, including improvement strategies. *Trends Food Science and Technology*, 104, 91–101.
10. Dimkpa, C.O., & Bindraban, P.S. (2016). Fortification of micronutrients for efficient agronomic production: a review. *Agronomy for Sustainable Development*, 36 (1), 1-26.
11. Farooq, M., Hussain, M., & Siddique, K.H. (2014). Drought stress in wheat during flowering and grain-filling periods. *Critical Reviews in Plant Sciences*, 33, 331–349.
12. Ferrat I.L. & Loyal C.J. (1999). Relation between relative water content, nitrogen pools, and growth of *P. vulgaris* and *P. acutifolius* during water deficit. *Crop Science*, 39, 467-474.
13. Hlahla, J.M., Mafa, M.S., van der Merwe, R., & Moloi, M.J. (2024). Exploring edamame survival mechanisms under combined drought and heat stress: Photosynthesis efficiency and carbohydrate accumulation, *Plant Stress*. <https://doi.org/10.1016/j.stress.2024.100616>.
14. Han, X., Han, S., Li, Y., Li, K., Yang, L., Ma, D., Fang, Z., Yin, J., Zhu, Y., & Gong, S. (2023). Double roles of light-harvesting chlorophyll a/b binding protein TaLhc2 in wheat stress tolerance and photosynthesis. *International Journal of Biological Macromolecules*, 253 (5), 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.127215>.
15. Hayyawi W.A., Al-Juthery, E.A., Ali, H.M., Rafid, N., Al-Uburi, Q., NAl-Shami, M., and Duraid K., & AL-Taey, A. (2020). Role of foliar application of Nano NPK micro fertilizers and yeast extract on growth and yield of wheat. *International Journal of Agricultural and Statistical Sciences*. 16 (1), 1295-1300.
16. Hussain, A., & Jatoi, W.A. (2021). Drought tolerance indices of wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes under water deficit conditions. *Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology*, 20, 1–19.
17. Ibrahim, A.U., 2019. Genetic variability, Correlation and Path analysis for Yield and yield components in F6 generation of Wheat (*Triticum aestivum* Em. Thell.). *IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science*. 12, 17–23.
18. Kamal, T., Atiq, M., Khan, U., Khan, F. U., & Ahmed, S. (2020). Comparison among different stability models for yield in bread wheat. *Sarhad Journal of Agriculture*, 36, 282–290.
19. Katherine, A., Steven, M., Augustine, P., Goke, A., Jordan, R., Christopher, P., Kimberly, K., Smith, D. (2023). At least it is a dry cold: the global distribution of freeze–thaw and drought stress and the traits that may impart poly-tolerance in conifers, *Tree Physiology*, 43(1), 1–15. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpac102>
20. Klughammer, C., & Schreiber, U. (2008). Complementary PS II quantum yields calculated from simple fluorescence parameters measured by PAM fluorometry and the Saturation Pulse method, *PAM application note*,s 1(2): 201-247.
21. Kruk, J., & Szymańska, R. (2021). Singlet oxygen oxidation products of carotenoids, fatty acids and phenolic prenyllipids. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*, 216, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2021.112148>.
22. Lai, H., Li, X., Chen, Y., Liu, Z. (2024). Mitigating heat-induced yield loss in peanut: Insights into 24-epibrassinolide-mediated improvement in antioxidant capacity, photosynthesis, and kernel weight. *Field Crops Research*, 316, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2024.109521>.
23. Li, G., Wan, S., Zhou, J., Yang, Z., & Qin, P. (2010). Leaf chlorophyll fluorescence, hyperspectral reflectance, pigments content, malondialdehyde and proline accumulation responses of castor bean (*Ricinus communis* L.) seedlings to salt stress levels. *Industrial Journal of Crops and Products*, 31(1), 13- 19.
24. Li, Q., Chen, M., Li, X., Wang, Y., Zhu, Q., Gao, S., Wang, J., Wang, Y., Yu, F., Wang, X., Huo, K., Zhang, L. (2022). Effects of foliar spraying of selenite at different time points on selenium concentration in wheat grains during grain filling period. *Grassland Science*, 68 (4), 354-361.
25. Mannan, M.A., Tithi, M.A., Islam, M.R. (2022). Soil and foliar applications of zinc sulfate and iron sulfate alleviate the destructive impacts of drought stress in wheat. *Cereal Research Communications*, 50, 1279–1289. <https://doi.org/10.1007/s42976-022-00262-5>
26. Minolta, M. (1989). Manual for chlorophyll meter SPAD-502. Minolta camera Co., Ltd., Japan.
27. Mohammed Al-Toki, M.A. & Halloul, R. (2021). The effect of chelated zinc and Nano-zinc and interaction on growth traits of Wheat (*Triticum aestivum* L.). *IOP Conf. Ser.: Earth Environment Science*. 923 012072.

28. Paknejad, F., Nasri, M., Tohidi Moghadam, H.R., Zahedi, H., & Jami Alahmad, M. (2007). Effects of drought stress on chlorophyll fluorescence parameters chlorophyll content and grain yield of wheat cultivars. *International Journal of Biological Sciences*, 7(6), 841-847.
29. Pequeno, D.N.L., Hernández-Ochoa, I.M., Reynolds, M., Sonder, K., MoleroMilan, A., Robertson, R.D., Lopes, M.S., Xiong, W., Kropff, M., & Asseng, S. (2021). Climate impact and adaptation to heat and drought stress of regional and global wheat production. *Environmental Research Letters*, 16(5), 1-18.
30. Raza, M.A.S., Zaheer, M.S., Saleem, M.F., Khan, I.H., Ahmad, S., Aslam, M.U., & Iqbal, R. (2020). Drought ameliorating effect of exogenous applied cytokinin in wheat. *Pakistan journal of agricultural sciences*, 57(3), 725-733.
31. Sandoval, Y., Tighe-Neira, R., Inostroza-Blancheteau, C., Soto-Cerda, B., & González-Villagra, J. (2024). Melatonin improves plant water status, photosynthetic performance, and antioxidant defense system in highbush blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) plants subjected to drought stress. *Scientia Horticulturae*, 323(1), 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2023.112528>.
32. Saquee, F.S., Diakite, S., Kavhiza, N.J., Pakina, E., Zargar, M. (2023). The Efficacy of Micronutrient Fertilizers on the Yield Formulation and Quality of Wheat Grains. *Agronomy*, 13(2), 566. <https://doi.org/10.3390/agronomy13020566>
33. Si, Z.H., Zain, M., Mehmood, F., Wang, G., Gao, Y., & Duan, A. (2020) Effect of nitrogen application rate and irrigation regime on growth, yield, and water-nitrogen use efficiency of drip-irrigated winter wheat in the North China Plain. *Journal of Agricultural Water Management*. 231, 106002.
34. Sommer, S.G., Han, E., Li, X., Rosenqvist, E., & Liu, F. (2023). The Chlorophyll fluorescence parameter Fv/Fm correlates with loss of grain yield after severe drought in three wheat genotypes grown at two CO₂ concentrations. *Plants*, 12, 436. <https://doi.org/10.3390/plants12030436>
35. Thakur, G., Singh, P., & Sharma, V. (2025). Phytohormonal crosstalk with flowering genes regulating drought stress response in citrus: a systematic review. *Journal of Plant Growth Regulation*, 14, 1-18. <https://doi.org/10.1007/s00344-025-11838-w>.
36. Tilahun, A., & Sven, S. (2003). Mechanisms of drought resistance in grain: PSII stomatal regulation and root growth. *Ethiop Journal of Science Technology*, 26, 137-144.
37. Titov, A.F., Kaznina, N.M., Karapetyan, T.A., Dorshakova, N.V., & Tarasova, V.N. (2022). Role of Selenium in Plants, Animals, and Humans. *Biology Bulletin Reviews*. 12, 189–200. <https://doi.org/10.1134/S2079086422020104>.
38. Ullah, M.I., Mahpara, S., Bibi, R., Ullah Shah, R., Ullah, R., Abbas, S., Ullah, M.I., Hassan, A.M., El-Shehawi, A.M., Brestic, M., Zivcak, M., Khan, M.I. (2021). Grain yield and correlated traits of bread wheat lines: Implications for yield improvement. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 28(10), 5714-5719. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.06.006>.
39. Wasaya, A., Manzoor, S., Yasir, T. A., Sarwar, N., Mubeen, K., Ismail, I. A., Raza, A., Rehman, A., Hossain, A., & EL Sabagh, A. (2021). Evaluation of Fourteen Bread Wheat (*Triticum aestivum* L.) Genotypes by Observing Gas Exchange Parameters, Relative Water and Chlorophyll Content, and Yield Attributes under Drought Stress. *Sustainability*, 13(9), 4799. <https://doi.org/10.3390/su13094799>
40. Yan, Z., Ma, T., Guo, S., Liu, R. & Li, M. (2021). Leaf anatomy, photosynthesis and chlorophyll fluorescence of lettuce as influenced by arbuscular mycorrhizal fungi under high temperature stress. *Scientia Horticulturae*, 280, 109933.
41. Yang, D., Luo, Y., Kong, X. Haung, C., & Wang, Z. (2021). Interactions Between Exogenous Cytokinin and Nitrogen Application Regulate Tiller Bud Growth via Sucrose and Nitrogen Allocation in Winter Wheat. *Journal of Plant Growth Regulation*, 40, 329–341.
42. Zhang, Y., Li, Y., Liu, J., Suo, L., Li, D., He, L., Duan, J., Wang, Y., Feng, W., & Guo, T. (2025). Exogenous melatonin alleviates drought stress in wheat by enhancing photosynthesis and carbon metabolism to promote floret development and grain yield. *Plant Stress*, 16(4), 1-19. <https://doi.org/10.1016/j.stress.2025.100885>.