

مقاله کوتاه پژوهشی

اولین گزارش زنبور (Morawitz, 1895) (Hym: Vespidae: Eumeninae) از ایران *Allodynerus dignotus*

مریم صالحی فرد^{۱*} - مهدی مدرس اول^۲ - جوزف گوزن لینتر^۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

تاریخ پذیرش: ۳۹۱/۴/۱۵

چکیده

خانواده Vespidae نقشی مهم در کنترل بیولوژیک برخی از آفات حشره‌ای ایفاء می‌کند. این خانواده شامل شش زیرخانواده و تقریباً ۴۱۵۰ گونه‌ی شناخته شده در جهان می‌باشد. (Carpenter, 1982). حشراتی به اندازه‌ی متوسط تا بزرگ، به طول ۴/۵ تا ۲۹ میلی‌متر با رنگ‌آمیزی متنوع، و اغلب به رنگ سیاه و زرد هستند. در جنس نر شاخص سبزه حلقه‌ای با انحنای بیشتر در انتهای و در جنس ماده دوازده حلقه‌ای است. لبه داخلی چشم‌های مرکب فرورفته و شبیه به کلیه می‌باشد (۲). Eumeninae یکی از زیرخانواده‌های خانواده‌ی Vespidae است که به انگلیسی زنبورهای کوزه‌گر (Potter wasps) یا زنبورهای بتا (Mason wasps) خوانده می‌شوند. در بررسی صورت گرفته روی گونه‌های این خانواده در منطقه‌ی مشهد و خومه، یک فرد نراز گونه‌ی (wasps) از زیرخانواده Eumeninae برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

واژه‌های کلیدی: بال غشاییان، *Allodynerus dignotus*, Eumeninae, Vespidae

مقدمه

گونه‌ها لانه‌ی خود را داخل حفره‌های طبیعی موجود در شاخه‌های کوچک گیاهان، دیوارها یا داخل حفره‌های خاک تهیه می‌کنند و سایر گونه‌ها لانه را با استفاده از گل یا خاک رس می‌سازند (۲). بیشتر گونه‌های غیر اجتماعی خانواده‌ی Vespidae در این زیرخانواده قرار دارند. این زیرخانواده دارای ۱۸۰ جنس و ۲۵۰۰ تا سه هزار گونه می‌باشد که در سراسر جهان پراکنده‌اند (۳). گونه‌های *Allodynerus Bluethgen*, ۱۹۸۳ میلی‌متر، عرض قطعی زیرپیشانی بیشتر از طول آن است. سر و قفس سینه برآق می‌باشد. حفره روی سر در ماده‌ها بزرگ و به شکل کلیه است. قلاط انتهایی حلقه‌ی آخر شاخص در نرها درشت و خمیده است و تا انتهای یا قسمت میانی حلقه دهم شاخص می‌رسد. قفس سینه نسبتاً کوتاه است. اطراف مزاوکوتوم و سپرچه منقوط می‌باشد. تگولا باریک، طویل و دارای قطعی پشتی توسعه یافته است که به سمت عقبی - انتهایی پاراتگولا کشیده شده است. پروپودیوم فاقد برآمدگی، درز بالابی آن توسعه‌ی کمتردارد و یا اغلب وجود ندارد. اولین حلقه قابل رویت شکم باریک‌تر از حلقه دوم است. عرض ترگوم اول بیشتر از طول آن و فاقد درز عرضی می‌باشد. این جنس در منطقه‌ی پالارکتیک پراکنده است (۴).

راسته‌ی بال غشاییان، با بیش از ۱۱۵۰۰ گونه‌ی توصیف شده دربردارنده بیش از ده درصد تنوع گونه‌های در جهان می‌باشد. این حشرات از نظر اقتصادی و بوم شناختی یکی از گروه‌های بسیار مهم می‌باشد. بیشتر گونه‌های زیرخانواده Eumeninae سیاه یا قهوه‌ای- رنگ هستند و معمولاً با نقوش قابل توجه و برجسته‌ی زرد، سفید، نارنجی، یا قرمز (یا ترکیبی از این رنگ‌ها) مزین می‌باشد. ولی برخی از گونه‌های مناطق استوایی رنگ‌های آبی یا سبز معدنی روشن در زمینه‌ی رنگ بدن نشان می‌دهند. معمولاً ۵ تا ۲۵ میلی‌متر طول دارند. به طور کلی در این گونه‌ها رنگ بدن سیاه با لکه‌های زرد و گاه قرمز، بال‌ها تیره و دارای لکه‌بال هستند. ناخن پا دوشاخه و شکم در برخی گونه‌ها ساقه‌دار است. ساق پای میانی دارای یک خار رأسی می‌باشد (۱). حشراتی مهاجم هستند و به منظور غذا دادن به لا روهای خود، پس از فلچ کردن لارو میزان‌ها آن‌ها را به لانه حمل می‌کنند. برخی از

۱ و ۲ - دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد گروه گیاه‌پژوهی، دانشکده کشاورزی،

دانشگاه فردوسی مشهد
(Email: m_salehifard@yahoo.com)

۳- استاد حشره‌شناسی مرکز تحقیقات بیولوژیک شهر لیز اتریش

شکل ۱- زنبور (*Allodynerus dignotus* Morawitz, 1895)

این حشره در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، ایران، عراق، سوریه، اسرائیل و ترکیه پراکنده می‌باشد (Guzenleitner, 1999). در زیر کلید شناسایی گونه‌های *Allodynerus* با تغییراتی اقتباس از Bestimmungstabellen mittel-und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hym.) J. Guzenleitner (1999) ارایه شده است.

۱- قفس سینه در نمای جانی به شکل برس و پوشیده از موهای متراکم (شکل ۱): ترگوم دوم اغلب دارای لکه‌های کاملاً جدا از هم و پراکنده، پیش ران و قسمت زیرین ران جفت پاهای اول از موهای کوتاه پوشیده شده ۲

- قفس سینه در نمای جانی دارای موهای مواج و نرم (شکل ۲): ترگوم دوم فاقد لکه‌های جدا از هم و پراکنده، پیش ران و قسمت زیرین ران جفت پاهای اول پوشیده از موهای کوتاه، و یا پیش ران و یک سوم ابتدایی ران جفت پاهای اول دارای موهای مواج و نرم ۳

- آرواره‌های بالا معمولی و با چهار دندانه مرتب در یک ردیف، شکاف قطعه‌ی زیرپیشانی کم عمق تر (عرض به عمق $\frac{3}{1}$) (شکل ۳): سپرچه هرگز به رنگ روشن نیست

Allodynerus floricola (Saussure)....

- دندانه‌ی سوم آرواره‌ی بالا دارای شکاف عمیق (شکل ۴a): شکاف قطعه‌ی زیرپیشانی عمیق‌تر (عرض به عمق $\frac{1.5}{1}$)، (شکل ۴b): سپرچه گاه به رنگ روشن

Allodynerus dignotus (Morawitz).

- شاخص کاملاً به رنگ سیاه، پیش ران و قسمت زیرین ران جفت پاهای اول دارای موهای کوتاه (شکل ۵): تگولا به جز یک درز باریک، اکثرًا کاملاً سیاه و فقط اطراف آن به رنگ زرد و قسمت وسطی آن همیشه کاملاً سیاه ۳

Allodynerus rossii (Lepeletier).....

قسمت زیرین شاخص به رنگ قرمز روشن، پیش ران و یک سوم ابتدایی قسمت زیرین ران جفت پاهای اول دارای موهای متراکم و بلند (شکل ۶): تگولا زرد و قسمت وسطی آن دارای یک لکه‌ی گرد سیاه رنگ که داخل آن شفاف و اطراف آن زرد ۴

مواد و روش‌ها

در این تحقیق جنس‌ها و گونه‌های متعدد از زنبورهای خانواده‌ی Vespidae، از شهرستان مشهد و حومه جمع‌آوری گردید. جهت جمع‌آوری نمونه‌های مورد نظر از تور حشره‌گیری استاندارد استفاده شد. این تور دارای حلقه‌ای به قطر سی سانتی‌متر، دسته‌ی تور به طول یک متر و ارتفاع کیسه‌ی تور دوبرابر بلندتر از عرض دهانه‌ی آن بود. توزعدن به دو روش ۱۸۰ درجه و یا پاندولی انجام گرفت. پس از اطالة کردن نمونه‌ها مورد شناسایی مقدماتی قرار گرفتند و برای تأیید نهایی به پروفسور جوزف گوزن لیتر در مرکز تحقیقات بیولوژیک شهر لینز اتریش ارسال شدند. از بین آن‌ها گونه‌ی (*Allodynerus dignotus* Morawitz, 1895) گلمکان جمع‌آوری گردید برای ایران گونه‌ای جدید تعیین گردید.


نتایج و بحث

در ایران تاکنون از جنس *Allodynerus* دو گونه‌ی *Allodynerus delphinalis* (Giraud, 1866) و *Allodynerus rossii* (Lepeletier, 1841) گزارش شده است.

گونه‌ی *Allodynerus dignotus*, Morawitz 1895

حشره‌ی کامل به طول ۸ تا ۱۱ میلی‌متر، قطعه‌ی زیرپیشانی ذوزنقه‌ای شکل و در قسمت جلوی بسیار فرورفته، رنگ آن کاملاً زرد و فاقد هرگونه لکه و علامت است. درز بین دو شاخص مشخص و دارای لکه‌ی زردرنگ پهنه می‌باشد. سطح زیرین حلقه‌ی اول شاخص زرد و در بقیه‌ی حلقه‌ها به رنگ زنگار است، حاشیه‌ی داخلی چشم مرکب نیز سد. در فضای بین فرق سر و حاشیه‌ی خارجی چشم مرکب لکه‌ای زردرنگ و کوچک قرار دارد. فرق سر کاملاً سیاه است. پیش‌گرده دارای شبیار عرضی و در قسمت فوقانی دارای نوار پهنه زرد، تگولا بلند و باریک و نوک آن تیز، به رنگ زرد و در مرکز دارای یک لکه‌ی گرد شفاف است. اسکوتوم سیاه رنگ و سپرچه دارای دو نوار زرد افقی که در وسط قرار گرفته‌اند، پس‌گرده دارای دو لکه‌ی زرددعمودی در هر دو طرف آن، عرض ترگوم دوم شکم تقریباً دو برابر ترگوم اول، ترگوم اول زرد با لکه‌ی سیاه رنگ مستطیل شکل در وسط که تا نیمه‌ی ابتدایی ترگوم می‌رسد. ترگوم دوم دارای وسعت بیشتری از رنگ سیاه و تنها حدود یک چهارم انتهایی آن زرد است. ساق و پنجه و قسمت رویی ران هر سه جفت پا زرد و قسمت زیرین ران پاها سیاه رنگ است.

- قسمت میانی استرنوم دوم در نمای نیم رخ به میزان کمی مقعر (شکل ۸a)، در نمای بالا شقیقه ها بهشدت محدب، موهای پی ران و قسمت ابتدای اولین جفت پاهای کوتاه تر و پراکنده تر، ژنیتالیا برنگ *Allodynerus koenigi* (Dusmet)
طلایی تیره تا قهوه ای
کمنگ تا سفید (شکل ۸b) (شکل ۷b)؛ در نمای بالا شقیقه ها کمی محدب، موهای پی ران و قسمت ابتدای اولین جفت پاهای بلند تر و انبوه تر، رنگ ژنیتالیا زرد *Allodynerus delphinalis* (Giraud)



- شکل (۱) میان گرده، شکل (۳) قطمه‌ی زیرپیشانی *Allodynerus floricola* گونه‌ی
 ۷) ژنیتالیا (شکل ۷) استرنوم دوم در نمای جانبی، شکل a : شکل (۲) میان گرده، شکل ۶) پیش ران و ران پای اول، شکل Alodynerus delphinalis گونه‌ی
 (۴) قطمه‌ی زیرپیشانی (شکل ۴b) آرواده‌ی بالا، شکل a : شکل (۵) پیش ران و ران پای اول *Allodynerus dignotus* گونه‌ی
 شکل (۵) پیش ران و ران پای اول *Allodynerus rossii* گونه‌ی
 ۸) ژنیتالیا (شکل ۸b) استرنوم دوم در نمای جانبی، شکل a : شکل *Allodynerus koenigi* گونه‌ی

منابع

- ۱- عباسی ر. ۱۳۸۵. بررسی فونیستیک و تنوع زیستی برخی از گونه‌های زنبورهای خانواده‌ی Vespidae در نیمه‌ی شمالی استان زنجان، پایان نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی ارشد، زیست شناسی (سیستماتیک جانوری)، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶ صفحه.
- ۲- مدرس اول م. ۱۳۸۹. رده بندی حشرات، جلد دوم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۹۱۴ صفحه.
- 3- Carpenter J.M. 1982. The Phylogenetic relationships and natural classification of the Vespoidea (Hymenoptera). *Systematic Entomology* 7: 11-38
- 4- Gusenleitner J. 1999. Bestimmungstabellen mittel-und Südeuropäischer Eumeniden. (Vespoidea, Hymenoptera). Teil: 10. *Linzer boil. Beitr.* 31/1, 93-101
- 5- Yamane S.K. 1990. A Revision of the Japanese Eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea). *Insecta Matsumurana*. n.s. 43: 1-189.