

بررسی تاثیر اسپری بتائین بر تحمل به یخ زدگی نخود (*Cicer arietinum L.*) در شرایط کنترل شده

نسرین مشتاقی^۱، عبدالرضا باقری^۱، احمد نظامی^۱، سکینه مشتاقی^۲

چکیده

بتائین به عنوان یکی از حفاظت کننده‌های اسمری، نقش مهمی در تحمل گیاهان به تنفس‌های غیرزیستی ایفا می‌کند. به همین منظور تاثیر کاربرد خارجی بتائین بر افزایش تحمل به سرما و یخ زدگی در گیاه نخود به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار شامل دو ژنتیپ نخود (MCC426 و MCC505)، سه سطح بتائین (۰، ۲۰ و ۴۰ میلی مولار) و شش تیمار دمایی (۰، -۳، -۶، -۹، -۱۲ و -۱۵ درجه سانتی گراد) مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان در مرحله ۶ تا ۷ برگی با بتائین اسپری شده و چهت خوسرمایی به مدت ۱۰ روز به اتفاق سرما منتقل شدند. سپس نمونه‌ها به فریزر ترموموگرادیان انتقال یافته و پس از اعمال تیمار یخ زدگی برای تعیین میزان خسارت آنها، درصد نشت الکترولیتی، درصد بقا و برخی اجزای رویشی آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بین ژنتیپ‌ها از نظر درصد نشت الکترولیتی و دمای ۵۰ درصد کشنده‌گی (LT50) بر اساس نشت الکترولیتی تفاوت معنی داری وجود دارد (۰/۰۵ ≤ p). افزایش سطح کاربرد بتائین در ژنتیپ متحمل سبب کاهش درصد نشت مواد و LT50 شده است ولی در ژنتیپ حساس تاثیری نداشته است. علاوه بر این همبستگی نسبتاً بالایی بین درصد نشت مواد و LT50 (= ۰/۴۷) مشاهده شده است که نشان دهنده کارایی روش اندازه گیری درصد نشت مواد برای تعیین درصد خسارت و تحمل به یخ زدگی است. ژنتیپها از نظر دمای ۵۰ درصد کشنده‌گی (LT50) بر اساس درصد بقا و همچنین دمای کاهنده ۵۰ درصد وزن خشک (RDMT50) با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند ولی سطوح مختلف بتائین از این نظر تفاوتی ایجاد نکرد. پاسخ ژنتیپها از نظر درصد بقا و برخی اجزای رویشی با یکدیگر متفاوت بود و ژنتیپ متحمل از توان بازیافت بیشتر و بهتری در مقایسه با ژنتیپ حساس برخوردار بوده است.

واژه‌های کلیدی: گلایسین بتائین، سرما، یخ زدگی، نشت الکترولیتی، RDMT50 و LT50.

مقدمه

کمبود آب ناشی از تنفس شوری، خشکی و سرما موثر هستند (۲۰). انباشتن املاح سازگار یکی از ساز و کارهای معمول برای تحمل تنفس است. املاح سازگار یا اسمولیت‌ها، ترکیباتی با وزن مولکولی کم و انحلال پذیری بالا هستند که در غلظت‌های بالا سمی نمی‌باشند. این ترکیبات تأثیر حداقلی روی pH یا تعادل بار سیتوسول دارند. این املاح همچنین در میان حیوانات، باکتری‌ها، گیاهان و همچنین در گونه‌های مختلف گیاهی متفاوت‌اند. گلایسین بتائین در بین اسمولیت‌ها از اهمیت خاصی در افزایش تحمل به تنفس‌ها برخوردار است. بتائین یک ترکیب آمونیومی چهارگانه

تنفس یخ زدگی از جمله عوامل اصلی تهدیدکننده رشد گیاهان در مناطق معتدل است. خوسرمایی موجب القای تغییرات فیزیولوژیکی، بیوشیمیابی، مولکولی و متابولیکی متعددی در گیاهان می‌شود (۱۲). از بین این تغییرات، افزایش مقاومت به تنفس کمبود آب که منجر به تحمل به یخ زدگی می‌شود، از مهمترین عوامل برای محافظت بافت‌های حساس در مقابل کمبود آب ناشی از یخ زدگی ذکر شده است (۱۵). علاوه بر این اسمولیت‌های سازگار نظری پلیول‌ها، پرولین و بتائین نیز در افزایش تحمل اثرات

۱- به ترتیب اعضای هیئت علمی و دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

میلی مولار بتائین^۲ اسپری شده و بعد از ۲۴ ساعت به اتاق کسرما جهت خوسرمایی در شرایط ۲/۰ درجه سانتی گراد (شب/روز) و طول دوره روشنایی ۹/۱۵ ساعت (تاریکی/روشنایی) و رطوبت نسبی بالا به مدت ۱۰ روز منتقل شدند. ۲۴ ساعت قبل از تیمار بخ زدگی بوته ها آبیاری شده و در مرحله بعد به فریزر ترموگرادیان منتقل شدند. دمای فریزر در شروع صفر درجه سانتی گراد بود که پس از گذاشتن نمونه ها با سرعت دو درجه سانتی گراد در ساعت کاهش یافت. این وضعیت شرایط را برای توزیع مجدد آب به بافت های گیاهی و جلوگیری از تشکیل بخ در داخل سلولها که در طبیعت بندرت اتفاق می افتد فراهم می کند (مورای و همکاران، ۱۹۸۸). اسپری گیاهچه ها با باکتری های ایجاد کننده هستک بخ (INAB)^۳ در دمای -۳- درجه سانتی گراد به منظور ایجاد هستک بخ بر روی گیاهان انجام شد و گیاهان پس از قرار گرفتن به مدت یک ساعت در دمای ،۰ -۳، -۶، -۹، -۱۲ و -۱۵ درجه سانتی گراد از فریزر خارج شده و در طول شب در دمای ۴ درجه سانتی گراد قرار گرفتند.

تعیین درصد نشت الکتروولیتی: در مرحله بعد برای اندازه گیری نشت الکتروولیتی، ۳ برگچه انتهایی از سه برگ پایینی جدا شده و در ارلن های حاوی ۱۰۰ میلی لیتر آب دوبار تقطیر شده قرار گرفت و نمونه ها به مدت ۶ ساعت بر روی شیکر قرار داده شد. سپس هدایت الکتریکی نمونه ها (EC₁) با دستگاه EC متر اندازه گیری شد. به منظور اندازه گیری میزان کل نشت الکتروولیت ها در اثر مرگ سلول، ارلن ها در فریزر -۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شدند و پس از باز شدن بخ به مدت ۶ ساعت بر روی شیکر تکان داده شدند و هدایت الکتریکی نمونه ها ثبت شد (EC₂). سپس درصد نشت الکتروولیت ها با استفاده از فرمول

$$\% EC = \frac{EC_1}{EC_2} \times 100$$

تعیین شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار انجام شد که فاکتورهای آزمایشی شامل ژنو تیپ (دو ژنو تیپ نخود MCC426 و سرما MCC505 حساس به سرما)، سه سطح بتائین (۰، ۲۰ و ۴۰


است که به صورت طبیعی در بیشتر گیاهان عالی تجمع می یابد. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که کاربرد بتائین در محدوده ۱۰-۲۵۰ میلی مولار سبب افزایش عملکرد تحت تنفس کمبود آب می شود، حتی اگرچه گیاه مورد نظر به عنوان یک گیاه تجمع دهنده آن عمل نماید (۵). در برخی گیاهان بتائین توسط یک سیستم دو آنزیمی در کلروپلاست ها سنتز می شود و جهت تنظیم فشار اسمزی پایداری و ثابت پروتئین ها و غشای سلولی کمک می نماید. نتایج بررسی های آزمایشگاهی نشان می دهد که بتائین سبب محافظت غشای سلولهای ریشه در مقابل واسرشتگی^۱ ناشی از گرما می شود (۱۶). یافه های اخیر نیز نشان می دهد که مهندسی گیاهان برای افزایش بیان این ترکیب در گیاهانی نظیر آرابیدوپسیس، برنج و توتون سبب افزایش تحمل به تنفس سرما و حفظ فعالیت فتوستنتزی در دماهای پایین شده است (۱۴). در مجموع علیرغم مطالعات فوق، پرنگ بودن نقش بتائین در افزایش ظرفیت گیاهان برای خوسرمایی و تحمل به بخ زدگی کاملاً مشخص نیست. به همین منظور این آزمایش با هدف بررسی تاثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر افزایش تحمل به بخ زدگی در دو ژنو تیپ نخود در شرایط کنترل شده طراحی گردید و میزان خسارت بخ زدگی به روش نشت الکتروولیتی و اندازه گیری درصد بقا تعیین گردید.

مواد و روش ها


این آزمایش در سال ۱۳۸۶ با استفاده از دو ژنو تیپ نخود به نام های MCC426 (متحمل به سرما) و MCC505 (حساس به سرما) در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی اجرا شد. تعداد چهار بذر در گلدان های پلاستیکی به قطر ۱۰ سانتی متر (نسبت ۱:۱:۱ از خاک، ماسه و خاک برگ) کشت شدند. گیاهان تا مرحله ۷ تا ۷ برگی در شرایط گلخانه (دمای ۲۵±۱ درجه سانتی گراد و فتوپریود طبیعی ۱۶/۸:تاریکی/روشنایی) نگهداری شدند. اسپری بتائین و تیمار یخبندان: در این مرحله گیاهان دو بار با فاصله ۱۲ ساعت با غلظت های مختلف ،۰ و ۲۰

MCC426 نشان دهنده تحمل بیشتر این ژنوتیپ نسبت به شرایط یخ‌زدگی است. متتحمل بودن این ژنوتیپ به سرما قبل از توسط نظامی و باقرقی (۳) گزارش شده است.

بررسی منحنی برآذش شده نشت الکتروولیت‌ها در سطوح مختلف بتائین نشان می‌دهد که افزایش سطح کاربرد بتائین در ژنوتیپ مقاوم سبب ملایم شدن شیب منحنی افزایش درصد نشت الکتروولیتی شده است ولی در ژنوتیپ حساس تاثیری نداشته است (شکل ۲). کاردونا و همکاران (۶) شیب منحنی نشت الکتروولیت‌ها را به عنوان یکی از مهمترین نشانه‌های احتمالی مرگ ناشی از تنفس سرما در گیاهان معرفی و خاطر نشان کردند که نمودار نشت الکتروولیت‌ها در




نمودار شکل ۱: میزان نشت الکتروولیتی ژنوتیپها.



را داشتند. قابل ذکر است که پایین تر بودن LT50 در ژنوتیپ MCC426 با نشت سلولی کمتر این ژنوتیپ نسبت به ژنوتیپ دیگر در شرایط تنش بیخ زدگی همراه بوده است. بررسی همبستگی بین درصد نشت الکترولیتها و LT50 ژنوتیپ‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که با کاهش درصد نشت الکترولیتها، دمای ۵۰ درصد کشنده‌گی ارقام مورد بررسی کاهش یافت (شکل ۳). مطالعه پایداری غشای سیتوپلاسمی بر اساس روش هدایت الکتریکی نشان داده که همبستگی نسبتاً بالایی بین میزان نشت الکترولیتها و LT50 وجود دارد و این همبستگی نشان دهنده کارایی این روش در ارزیابی مقاومت به سرما است که با نتایج این آزمایش منطبق است (۱).

درصد بقا و LT50: ژنوتیپها از نظر درصد بقا و LT50 تفاوت معنی‌داری با یکدیگر داشتند (جدول ۱). بر اساس نتایج بدست آمده درصد بقای ژنوتیپ MCC426 در کل آزمایش برابر $63/6$ درصد و برای ژنوتیپ MCC505 تنها ۵۰ درصد بوده است. درصد بقای ژنوتیپ MCC426 حدود ۲۷ درصد بیشتر از ژنوتیپ حساس بوده است ولی LT50 آنها تنها یک درجه با یکدیگر اختلاف داشته است (جدول ۱).



نمودار شکل ۳: رابطه بین درصد نشت الکترولیتی و LT50

گونه‌های سازگار با تنش سرما از شبی کمتری برخوردار است و در مقابل در گونه‌های حساس به تنش سرما این شبی، شدیدتر است. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داده که تا دمای -9 درجه سانتی‌گراد تاثیر کاربرد خارجی بتائین بر روی درصد نشت مواد معنی دار بوده است (شکل ۲) و با کاهش دما به زیر -9 درجه سانتی‌گراد، درصد نشت الکترولیتها در سطوح مختلف بتائین بطور معنی‌داری افزایش یافته است.

بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی از نظر LT50 نیز تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بطوریکه ژنوتیپ MCC505 و LT50 به ترتیب بیشتر ($5/5$) و کمترین ($8/9$) MCC426

جدول ۱: اثرات ژنوتیپ، بتائین و ژنوتیپ × بتائین بر درصد بقا، LT50 و RDMT50 و اجزای رویشی نخود سه هفته پس از بازیافت.

تعداد شاخه در گیاه	وزن خشک (میلی گرم)						RDMT50 (درجه سانتی گراد)	LT50 (درجه سانتی گراد)	درصد بقا	تیمار
	شاخه ها	ساقه	شاخه ها	ساقه	ساقه	گیاه				
ژنوتیپ										
+/۷	۷/۷	۱۴/۱	۷۲	۱۸۰	۲۵۱	-۱۲	-۱۱	۶۳/۶	G1=MCC426	
-/۷	۶/۲	۱۳/۵	۵۸	۱۲۸	۱۸۷	-۹	-۱۰	۵۰/۱	G2=MCC505	
+/۳	+/۶	+/۶	۱۲	۱۰	۲۸	+/۶	+/۵	۴/۶	LSD (+/-۵)	
بتائین (میلی مولار)										
+/۵	۷/۷	۱۲/۴	۷۹	۱۶۷	۲۲۶	-۱۱	-۱۰	۵۶	L1=+	
-/۷	۶/۸	۱۱/۵	۶۸	۱۶۴	۲۱۲	-۱۱	-۱۰	۵۴/۱	L2=-	
+/۹	۷/۸	۱۲/۳	۷۹/۵	۱۷۴	۲۳۶	-۱۱	-۱۰	۵۲/۵	L3=+	
+/۴	۱/۱	-/۷	۱۳/۶	۱۲/۲	۳۲	+/۸	+/۶	۵/۱	LSD (+/-۵)	
ژنوتیپ×بتائین										
-/۴	۸/۱	۱۲/۷	۷۲	۱۷۰	۲۲۹	-۱۲	-۱-	۵۹/۷	G1L1	
+/۸	۷/۲	۱۱/۶	۵۱	۱۷۳	۲۲۵	-۱۱/۵	-۱۱	۶۳/۶	G1L2	
+/۱	۸/۲	۱۲/۲	۸۴	۱۸۶	۲۸۰	-۱۲/۵	-۱۱	۶۸/۵	G1L3	
+/۷	۷/۳	۱۲/۳	۸۷	۱۶۵	۲۲۳	-۹	-۱۰/۳	۶۸/۳	G2L1	
+/۷	۶/۵	۱۱/۴	۸۵	۱۵۶	۱۹۹	-۱۰	-۱۰	۶۳/۶	G2L2	
+/۸	۶/۸	۱۱/۵	۷۵	۱۶۲	۱۹۵	-۹/۵	-۹/۶	۶۴/۵	G2L3	
-/۵	۱/۳	-/۸	۱۵/۱	۱۳/۸	۴۱	+/۲	-/۸	۶/۹	LSD (-/-۵)	

متحمل به سرما تا دمای ۹- درجه سانتی گراد چندان تحت تاثیر قرار نگرفته است. درصد بقای ژنوتیپ متحمل در این دما ۸۸ درصد و حدود ۱/۴ برابر نمونه حساس بوده است. درصد بقا در ژنوتیپ حساس در فاصله دمایی صفر تا ۹- به اندازه ۲۷ درصد کاهش یافته است در حالیکه در ژنوتیپ مقاوم این کاهش تنها ۸ درصد بوده است. با وجود این در تیمار دمایی ۱۲- درجه سانتی گراد، درصد تلفات در ژنوتیپ حساس و ژنوتیپ مقاوم یکسان و برابر با ۹۴ درصد شده است. (جدول ۳).

بازیافت و رشد مجدد گیاه پس از تیمار یخ‌زدگی
 اثر ژنوتیپ بر وزن خشک گیاه در پایان دوره بازیافت معنی دار بوده است (جدول ۱). وزن خشک گیاه در ژنوتیپ حساس ۳۴ درصد کمتر از ژنوتیپ مقاوم بوده است. ضمن اینکه RDMT50 در ژنوتیپ مقاوم برابر ۱۲- درجه سانتی گراد و در ژنوتیپ حساس این شاخص ۳ درجه سانتی گراد بیشتر از ژنوتیپ مقاوم بوده است. در مطالعه نظامی و همکاران (۴) این اختلاف دو درجه بوده است. مقایسه میانگین‌های بدست آمده از وزن خشک سایر اجزای گیاهی نیز نشان می‌دهد که وزن خشک ساقه در ژنوتیپ حساس ۲۸ درصد کمتر از ژنوتیپ مقاوم است و وزن خشک شاخه‌ها در ژنوتیپ مقاوم است. در مورد طول ساقه نیز می‌توان گفت که طول ساقه و همچنین شاخه‌ها در ژنوتیپ مقاوم نسبتاً بیشتر از ژنوتیپ حساس بوده است. طول ساقه و شاخه‌ها در ژنوتیپ حساس به ترتیب ۴ درصد و ۲۰ درصد کمتر از ژنوتیپ مقاوم بوده است. تعداد شاخه نیز در ژنوتیپ حساس ۴ درصد کمتر از ژنوتیپ مقاوم بوده است. اگرچه دو ژنوتیپ از لحاظ تعداد شاخه جانبی تولید شده با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند ولی وزن خشک شاخه‌های تولیدی و همچنین طول آنها در ژنوتیپ متحمل بیشتر از بیشتر ژنوتیپ حساس بوده است و همین امر احتمالاً قدرت بقای ژنوتیپ حساس را در شرایط یخ‌زدگی تایید می‌کند. در مورد اغلب صفات موردن بررسی اثر بتائین و اثر متقابل بتائین ۴ ژنوتیپ بر رشد مجدد گیاه پس از اعمال تیمارهای یخ‌زدگی معنی دار بوده است (جدول ۱). بر اساس میانگین داده‌های بدست آمده اثر بتائین بر LT50 و RDMT50 معنی

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در کل کاربرد بتائین تاثیری بر درصد بقای گیاهان نداشته است و نتوانسته است میزان LT50 و یا RDMT50 را کاهش دهد (جدول ۱). لیکن اثر متقابل ژنوتیپ و سطح کاربرد بتائین نشان می‌دهد که عکس العمل ژنوتیپها متفاوت بوده است. به گونه ایکه در ژنوتیپ مقاوم افزایش سطح بتائین به ۲۰ و ۴۰ میلی مولار سبب کاهش LT50 به اندازه یک درجه سانتی گراد شده است و RDMT50 را به اندازه ۱/۵ درجه سانتی گراد کاهش داده است ولی تاثیر آن در ژنوتیپ حساس بارز نبوده است. در بررسی آلارد و همکاران (۵) کاربرد خارجی بتائین در گندم به مقدار ۲۵۰ میلی مولار سبب کاهش LT50 به اندازه ۵ درجه سانتی گراد در گیاهان خوسه‌مایی یافته و خو نیافته شده است.

اثر تیمار یخ‌زدگی نیز بر درصد بقای گیاهان معنی دار بود (جدول ۲). با کاهش دما به کمتر از ۹- درجه سانتی گراد درصد بقای گیاهان کاهش معنی داری داشته است. کاهش درصد بقای گیاهان بین دمای صفر تا ۹- درجه سانتی گراد ۳/۴ درصد به ازای کاهش هر درجه سانتی گراد دما بود، در حالیکه این کاهش در دمای بین ۹- تا ۱۵- درجه سانتی گراد ۱۳/۳ درصد به ازای هر درجه سانتی گراد رسید (جدول ۴). بنابراین اثر منفی درجه حرارت‌های کمتر از ۹- درجه سانتی گراد روی درصد بقای گیاهان شدیدتر از درجه حرارت‌های بالاتر از این دما بوده است. نظامی و همکاران (۴) نیز به نتیجه مشابهی در این زمینه دست یافته‌ند و کاهش درصد بقای گیاهان را در دمای بین ۸- تا ۱۲- درجه سانتی گراد در حدود ۱۰/۴ درصد به ازای کاهش هر درجه سانتی گراد تخمین زدند.

اثر متقابل دما×سطح بتائین نیز بر درصد بقای گیاهان معنی دار بود (جدول ۲). نتایج بدست آمده نشان داد که سطح کاربرد بتائین تاثیری مثبت بر افزایش درصد بقای گیاهان نداشته است. حتی با کاربرد سطح ۴۰ میلی مولار بتائین اندکی درصد بقا نسبت به عدم کاربرد بتائین کاهش داشته است. درصد بقا در ۳- درجه سانتی گراد در عدم کاربرد بتائین ۹۵ درصد و با کاربرد ۲۰ و ۴۰ میلی مولار بتائین به ۸۳ و ۸۶ درصد کاهش یافته است. در دمای ۶- و ۹- نیز می‌توان این تفاوت اندک را مشاهده نمود (جدول ۲). بررسی اثر متقابل دما×ژنوتیپ نیز نشان داد که بقای ژنوتیپ

جدول ۲: تاثیر متقابل دمای سطح بتائین بر درصد بقا و وزن خشک گیاه نخود (میانگین هر تکرار یا گلدان) سه هفته پس از بازیافت در شرایط گلخانه.

تیمار دمای یخ زدگی (درجه سانتی گراد)	درصد بقا	وزن خشک (میلی گرم)			طول (سانتی متر)			تعداد شاخه در گیاه
		گیاه	ساقه	شاخه ها	گیاه	ساقه	شاخه ها	
صفرا	۹۸	۲۱۲	۲۱۸	۹۶	۱۶/۴	۱۰/۳	۱/۲	
-۳	۸۸	۲۸۲	۱۸۸	۹۳	۱۶/۸	۱۱/۷	۱	
-۶	۷۷	۲۸۹	۱۹۵	۹۳	۱۶/۳	۹/۷	۱/۲	
-۹	۷۴/۵	۲۱۷	۱۲۷	۸۹	۱۲/۱	۶-	۱/۱	
-۱۲	۶	۷۴	۶۲	-	۴/۵	-	-	
-۱۵	-	-	-	-	-	-	-	
LSD (+/-۰۵)	۶/۹	۲۱	۱۷/۸	۱۰/۱	۰/۸	۱/۱	۰/۵	
نمای سطح بتائین								
بتابین صفر								
صفرا	۱۰۰	۲۵۰	۲۱۵	۱۴۰	۱۷/۵	۱۲/۵	۰/۵	
-۳	۹۵	۲۲۶	۱۹۶	۱۴۰	۱۷/۲	۱۲/۷	۰/۵	
-۶	۸۰	۲۷۵	۲۰۰	۷۵	۱۸	۸/۵	۰/۸	
-۹	۷۸	۲۰۷	۱۹۵	۱۱۲	۱۷/۷	۱۲/۵	۱/۲	
-۱۲	۴/۸	۷۲	۶۰	-	۴/۶	-	-	
-۱۵	-	-	-	-	-	-	-	
LSD (+/-۰۵)	۷/۱	۲۲	۱۷/۱	۱۵/۷	۰/۹	۱/۴	۰/۶	
بتابین ۴۰ میلی مولار								
بتابین صفر								
صفرا	۹۵	۲۷۲	۱۹۶	۷۵	۱۳/۸	۱۰/۸	۱/۵	
-۳	۸۳	۲۶۵	۲۰۰	۶۵	۱۵/۸	۱۰-	۱	
-۶	۷۵	۲۰۴	۲۱۴	۹۰	۱۶/۷	۸	۱/۱	
-۹	۷۰/۶	۱۲۸	۱۰۳	۲۵	۸/۵	۳/۵	۰/۵	
-۱۲	۱۰	۹۰	۸۰	-	۴/۵	-	-	
-۱۵	-	-	-	-	-	-	-	
LSD (+/-۰۵)	۷/۱	۴۲	۱۹/۱	۱۵/۷	۰/۹	۱/۴	۰/۶	
بتابین ۴۰ میلی مولار								
بتابین صفر								
صفرا	۹۹	۲۱۶	۲۴۵	۷۲	۱۸	۱۲	۱/۸	
-۳	۸۶	۲۴۳	۱۷۰	۷۵	۱۷/۳	۱۲/۵	۱/۲	
-۶	۷۶	۲۶۷	۱۵۲	۱۱۵	۱۶/۷	۱۲/۵	۱/۲	
-۹	۷۵	۲۱۷	۸۵	۱۳۱	۱۰	۱۶/۱	۱/۳	
-۱۲	۵	۵۹	۴۷	-	۴/۵	-	-	
-۱۵	-	-	-	-	-	-	-	
LSD (+/-۰۵)	۷/۱	۴۳	۱۹/۱	۱۵/۷	۰/۹	۱/۴	۰/۶	

شده است که این کاهش معنی دار نبوده است. طول ساقه و شاخه ها و همچنین تعداد شاخه در ژنوتیپ حساس تفاوت معنی داری نداشته است ولی در ژنوتیپ متتحمل طول شاخه ها با افزایش کاربرد بتائین تغییری نکرده است، اما طول ساقه و شاخه افزایش یافته است (جدول ۱).

دماهای یخ زدگی نیز اثر معنی داری بر رشد مجدد گیاه داشتند (جدول ۲). با کاهش دما به زیر صفر درجه اغلب اجزای رشدی کاهش نشان دادند ولی در دمای -۹ درجه سانتی گراد با افت شدیدی مواجه شدند. به طوریکه وزن

دار نبوده است و عملاً تفاوتی بین سطوح مختلف کاربرد بتائین مشاهده نشد. اما تاثیر کاربرد بتائین بر وزن خشک در ژنوتیپهای مختلف متفاوت بوده است به گونه ای که در ژنوتیپ متتحمل افزایش سطح بتائین تا ۴۰ میلی مولار نسبت به عدم کاربرد آن سبب افزایش ۲۲ درصدی در وزن خشک گیاه، افزایش ۹ درصدی در وزن خشک ساقه و افزایش ۱۶ درصدی در وزن خشک شاخه ها شده است ولی در ژنوتیپ حساس این روند بر عکس بوده است. افزایش سطح بتائین در ژنوتیپ حساس سبب ۱۳ درصد کاهش در وزن خشک گیاه

جدول ۳: اثر متقابل ژنتیپ × دمای یخ زدگی بر درصد بقا و اجزای رویشی نخود (میانگین هر تکرار) سه هفته پس از بازیافت.

تیمار دمای یخ زدگی (درجه سانتی گراد)	درصد بقا	وزن خشک (میلی گرم)			طول (سانتی متر)		تعداد شاخه در گیاه
		گیاه	ساقه	شاخه ها	ساقه	شاخه ها	
MCC426							
صفر	۹۶	۳۷۲	۲۰۴	۶۹	۱۴	۹/۶	۰/۶
-۳	۹۲	۲۹۷	۲۲۲	۷۴	۱۶	۱۱/۵	۰/۹
-۶	۹۴	۲۹۰	۲۱۵	۷۵	۲۲/۵	۱۲/۶	۱/۳
-۹	۸۸	۲۴۵	۱۱۸	۲۹	۱۲/۸	۱۲/۳	۱/۴
-۱۲	۶/۵	۷۲	۵۷	۱۵	۵/۱	*	*
-۱۵	*	*	*	*	*	*	*
LSD (+/-۵)	۷	۴۲	۱۳/۹	۱۵/۵	۰/۹	۱/۴	۰/۶
MCC505							
صفر	۸۸	۳۵۲	۲۲۳	۱۱۹	۱۸/۹	۱۰/۸	۱/۶
-۳	۷۴	۲۶۵	۱۵۵	۱۱۰	۱۷	۱۲	۱
-۶	۶۷	۲۲۵	۱۷۵	۶۰	۱۶/۱	۶/۷	۱
-۹	۶۴	۱۸۹	۱۳۶	۵۳	۱۱/۳	۷/۷	۰/۷
-۱۲	۶	۷۵	۶۷	۸	۴	*	*
-۱۵	*	*	*	*	*	*	*
LSD (+/-۵)	۷	۴۲	۱۳/۹	۱۵/۵	۰/۹	۱/۴	۰/۶

درصد در دمای صفر درجه سانتی گراد به ۴۱ درصد در دمای -۹ درجه سانتی گراد رسیده است. در سطح ۲۰ میلی مولار بتائین و عدم کاربرد آن سهم وزن خشک شاخه ها از وزن خشک کل گیاه با کاهش دماهای یخ زدگی، کاهش یافته است ولی میزان این کاهش در عدم کاربرد بتائین بیشتر از کاربرد ۲۰ میلی مولار بتائین بوده است و از ۴۰ درصد در دمای صفر درجه به ۳۶ درصد در دمای -۹ درجه سانتی گراد رسیده است. در سطح کاربرد ۲۰ میلی مولار بتائین نیز سهم وزن خشک شاخه ها از وزن خشک کل گیاه روند کاهشی داشته است و از ۲۷ درصد در دمای صفر درجه سانتی گراد به ۱۹ درصد در دمای -۹ درجه سانتی گراد رسیده است. ولی با کاربرد ۴۰ میلی مولار بتائین سهم وزن خشک شاخه ها از وزن خشک کل گیاه افزایش یافته است و از ۲۳ درصد در دمای صفر درجه سانتی گراد به ۶۰ درصد در دمای -۹ درجه سانتی گراد رسیده است.

اثر متقابل ژنتیپ × دما نیز بر خصوصیات رشدی گیاه معنی دار بوده است (جدول ۳). در ژنتیپ حساس با کاهش دما از صفر به -۹ درجه سانتی گراد وزن خشک گیاه، وزن خشک ساقه، وزن خشک شاخه ها و طول آنها به ترتیب ۴۶،

خشک ساقه و شاخه ها در فاصله دمایی صفر تا -۹ درجه سانتی گراد به ترتیب ۴/۵ و ۰/۸ درصد به ازای هر درجه سانتی گراد کاهش دما، کاهش داشته است. در حالیکه این مقادیر در فاصله دمایی -۹ تا ۱۵ درجه سانتی گراد حدود ۱۲/۲ و ۱۴/۸ درصد به ازای کاهش هر درجه سانتی گراد کاهش یافته است. این وضعیت در ارتباط با طول ساقه و شاخه ها نیز از روند مشابهی پیروی می کند. به گونه ای که در فاصله دمایی صفر تا -۹ درجه سانتی گراد، طول ساقه و شاخه ها به ترتیب ۰/۲ و ۰/۰ درصد به ازای کاهش هر درجه سانتی گراد، کاهش یافته است در حالیکه در فاصله بین -۹ تا -۱۵ درجه سانتی گراد این مقادیر ۱۰/۹ و ۶/۷ درصد به ازای کاهش هر درجه سانتی گراد کاهش مشاهده یافته است (جدول ۴). چن و همکاران با اعمال تیمارهای یخ زدگی در شرایط کنترل شده بر روی گندم مشاهده کردند که کاهش دماهای یخ زدگی از ۵ به ۱۰ درجه سانتی گراد سبب کاهش ۲۰ درصدی رشد مجدد اندامهای هوایی گندم نسبت به تیمار عدم یخ زدگی شده است (۷).

سهم وزن خشک شاخه ها از وزن خشک کل گیاه در کل با کاهش دماهای یخ زدگی افزایش یافته است و از ۳۰

جدول ۴: درصد و مقدار کاهش اجزای رشدی گیاه نخود (میانگین دو ژنوتیپ) به ازای هر درجه سانتی گراد کاهش دما در محدوده دماهای آزمایش.

کاهش طول				کاهش وزن خشک				محدوده دماهی	
شاخص ها		ساقه		شاخص ها		ساقه			
سانتی متر	درصد	سانتی متر	درصد	میلی گرم	درصد	میلی گرم	درصد		
+۰/۳	+۰/۳	+۰/۵	+۲/۹	+۰/۹	+۰/۸	+۱/۱	+۴/۵	+۰/۶	
۱/۶	۱۶/۷	۱/۳	۱۰/۹	۱۳/۳	۱۴/۸	۱۵/۵	۱۲/۲	۲۹/۲	
								۱۳/۴	
								۱۵-۲۶	

گزارش های مختلف حاکی از این است که پدیده خوسرمایی سبب کاهش درصد نشت مواد (۵) و افزایش درصد بقا در ژنوتیپ های نخود شده است (۴). اگرچه در برخی مطالعات کاربرد خارجی بتائین سبب افزایش مقدار داخلی بتائین و افزایش بقای گیاهان در تنش سرما و يخ زدگی شده است ولی میزان این افزایش تحمل در برابر تنش يخ زدگی نسبت به سایر تشنها کمتر بوده است (۸). در برخی مطالعات نیز کاربرد توام خوسرمایی و بتائین توانسته تحمل گیاهان را در برابر این تنش ها افزایش دهد. مطالعه مشابهی نیز بر روی گندم و جو صورت گرفته و نشان داده است که خوسرمایی به تنها یی نمی تواند به اندازه کاربرد توام این دو عامل موثر باشد، زیرا در شرایط خوسرمایی، مقدار بتائین داخلی عامل محدود کننده ای برای تحمل می باشد و کاربرد خارجی آن می تواند این محدودیت را برطرف نماید (۴). البته در گندم مقدار کاربرد بتائین در حد ۲۵۰ میلی مولار مناسب تشخیص داده شده (۴) و بنظر می رسد که در این مطالعه نیز برای افزایش مقاومت به تنش يخ زدگی در ژنوتیپ حساس، نیاز به غلظت های بالاتری از بتائین است. کیشیتانی و همکاران (۱۷) توانستند در گیاه جو همبستگی بین مقدار تجمع بتائین در طول فرایند خوسرمایی را با میزان تحمل به يخ زدگی به اثبات برسانند. علاوه بر این CodA افزایش تجمع بتائین در آراییدوپسیس تراریخته با ژن سبب افزایش تحمل تنش سرمآزادگی شده ولی در افزایش تحمل به يخ زدگی موثر نبوده است (۹؛ ۱۳). کاربرد خارجی بتائین در برنج و برخی گیاهان نظیر باقلاء، گوجه فرنگی و گندم نیز باعث افزایش تحمل در برابر تنش شوری و خشکی شده است (۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳).

۴۱، ۵۵، ۴۰ و ۲۹ درصد کاهش یافته است و همچنین تعداد شاخه نیز در این فاصله دماهی ۵۸ درصد کاهش یافته است (جدول ۳). بنابراین تمام اجزای رشدی در ژنوتیپ حساس با کاهش دما کاهش یافته است. در ژنوتیپ متحمل نیز وزن خشک گیاه، وزن خشک ساقه و شاخه ها با کاهش دما به ترتیب ۳۴، ۶۱ و ۵۷ درصد کاهش یافته است اما تغییر در طول متفاوت بوده است. طول ساقه و شاخه ها در ژنوتیپ متحمل تا دمای -۶ درجه سانتی گراد روندی افزایشی داشته و میزان این افزایش ۶۰ درصد بوده است در حالیکه پس از آن کاهش یافته است. تعداد شاخه نیز تا دمای -۹ درجه سانتی گراد ۵۹ درصد افزایش داشته است و پس از آن کاهش یافته است. در مجموع بازیافت ژنوتیپ متحمل به سرما بهتر از ژنوتیپ حساس بوده است (جدول ۳).

در مجموع می توان گفت که در این آزمایش LT50 بر اساس درصد بقا در ژنوتیپ حساس یک درجه بیشتر از ژنوتیپ متحمل است در حالیکه RDMT50 سه درجه بیشتر از ژنوتیپ متحمل می باشد. افزایش کاربرد بتائین تاثیر مثبتی بر افزایش درصد بقا ، LT50 و RDMT50 نداشته است. ضربه همبستگی بین LT50 و RDMT50 در این آزمایش ۰/۹ بود که نشان دهنده کارایی این شاخص در تخمین میزان خسارت سرما به گیاه می باشد. لذا به نظر می رسد علاوه بر شاخص LT50، بتوان از این شاخص نیز برای ارزیابی میزان خسارت سرما به گیاه و بازیافت و رشد مجدد آن استفاده کرد. نتایج آزمایش های اخیر نشان می دهد اگرچه افزایش سطح بتائین سبب مقاومت بیشتر ژنوتیپ متحمل در شرایط يخ زدگی شده است ولی در ژنوتیپ حساس تاثیری نداشته است. البته نقش خوسرمایی را نمی توان دور از نظر داشت.

منابع

- ۱- بیرامی زاده، ا.، ای. ارشد، ب. یزدی صمدی و م.ر. قنادها. ۱۳۸۱. بررسی ژنتیک پایداری غشای سیتوپلاسمی در گندم. «چکیده مقالات سومین همایش کاهش ضایعات ناشی از سرما و یخ زدگی گیاهان زراعی و باغی کشور». صفحات ۶۵ تا ۶۸.
- ۲- میرمحمدی میدی، ع.م. ۱۳۷۹. جنبه‌های فیزیولوژی و به نژادی تنفس‌های سرما و یخ‌زدگی گیاهان زراعی. انتشارات گلbin، اصفهان.
- ۳- نظامی، ا. و ع. باقری. ۱۳۸۰. ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه، مجله علوم و صنایع کشاورزی ۱۵: ۱۶۲-۱۵۶.
- ۴- نظامی، ا.، باقری، ع.، رحیمیان، ح.، کافی، م. و نصیری، م. ۱۳۸۵. ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنتیکی نخود (*Cicer arietinum L.*) در شرایط کنترل شده. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ۴ (الف): ۲۵۷-۲۶۸.
- 5-Allard, F., Houde, M. , Krol, M. , Ivanov, A. , Norman, P.A. and F. Sarhan. 1998. Betaine improves freezing tolerance in wheat. *Plant Cell Physiol.* 39:1194-1202.
- 6-Cardona, C.A., R.R. Duncan, and O. Lindstrom. 1997. Low temperature tolerance assessment in paspalm. *Crop Sci.* 37: 1283-1291.
- 7-Chen, T.H., Gusta, L.V. and Fowler, D.B. 1983. Freezing injury and root development in winter cereals. *Plant Physiol.* 73,773-777.
- 8-Demiral, T. and Turkan, I. 2006. Exogenous glycinebetaine affects growth and proline accumulation and retards senescence in two rice cultivars under NaCl stress. *Environmental and Experimental Botany* 56: 72–79.
- 9-Deshnium, P., Gombos, Z., Nishiyama, Y. and Murata, N. 1997. The action in vivo of glycine betaine in enhancement of tolerance of *Synechococcus* sp. strain PCC7942 to low temperature. *J. Bacteriol.* 179,339-344.
- 10-Diaz-Zorita, M., Fernández-Canigia, M.V., Grossi, G.A. 2001. Applications of foliar fertilizers containing glycinebetaine improve wheat yields. *J. Agron. Crop Sci.* 186, 209–215.
- 11-Gadallah, M.A.A., 1999. Effects of proline and glycinebetaine on *Vicia faba* responses to salt-stress. *Biol. Plant.* 42, 249–257.
- 12-Guy, C.L. 1990. Cold acclimation and freezing stress tolerance: role of protein metabolism. *Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.* 41:187-223.
- 13-Harinatsu, P., Tsutsui, K., Takabe, T., Nomura, M., Takabe, T. and Kishitani, S., 1996. Exogenous glycinebetaine accumulation and increased salt-tolerance in rice seedlings. *Biosci. Biotech. Biochem.* 60, 366–368.
- 14-Hayashi, H. , Alia Mustardy, L. , Deshnium, P. , Ida, M. And N. Murata. 1997. Transformation of *Arabidopsis thaliana* with the *codA* gene for choline oxidase; accumulation of glycine betaine and enhanced tolerance to salt and cold stress. *Plant J.* 12:133-142.
- 15-Houde, M. , Daniel, C. , Lachapelle, M. , Allard, F. , Laliberte, S. and F. Sarhan. 1995. Immunolocalization of freezing-tolerance-associated proteins in the cytoplasm and nucleoplasm of wheat crown tissues. *Plant J.* 8:583-593.
- 16-Jolivet, Y. , Larher, F. and J. Hamelin. 1982. Osmoregulation in halophytic higher plants: the protective effect of glycine betaine against the heat destabilization of membranes. *Plant Sci. Lett.* 25:193-201.
- 17-Kishitani, S., Watanabe, K., Yasuda, S., Arakawa, K. and Takabe, T. 1994. Accumulation of glycinebetaine during cold acclimation and freezing tolerance in leaves of winter and spring barley plants. *Plant Cell Environ.* 17, 89-95.
- 18-Makela, P., Karkkainen, J. and Somersalo, S. 2000. Effect of glycinebetaine on chloroplast ultrastructure, chlorophyll and protein content, and RuBPCO activities in tomato grown under drought or salinity. *Biol. Plant.* 43, 471–475.
- 19-Murry, G.A., Eser, D. , Gusta, L.V. and G. Eteve. 1988. Winter hardiness in pea, lentil, faba bean and chickpea. In R.J. Summerfield (Ed.) *World Crops: Cool Season Food Legumes*. Kluwer Academic Publishers.The Netherlands. P. 831-843.
- 20-Rhodes, D. and A.D. Hanson. 1993. Quaternary ammonium and quaternary sulfonium compounds in higher plants. *Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.* 44:357-384.

Investigation of betaine spray on freezing tolerance of chickpea (*Cicer arietinum L.*) in controlled conditions

N. Moshtaghi, A. Bagheri, A. Nezami, S. Moshtaghi¹

Abstract

Betaine as an osmoprotectant has an important role in plant tolerance in abiotic stresses. Therefore, the effect of exogenous application of betaine on increasing tolerance to cold and freezing tolerance of two chickpea genotypes were studied. Electrolyte leakage was used in this study for determination of injury percentage. This experiment carried out in factorial experiment based on complete randomized design with three replications containing two genotypes of chickpea (MCC426 and MCC505), three levels of betaine (0, 20 and 40 mM) and six temperature treatments (0, -3, -6, -9, -12 and -15 °C). The plants were sprayed with betaine in 6-7 leaves stage and transferred to cold room for cold acclimation. Then the plants were transferred to thermo-gradient freezer and determined the electrolyte leakage percentage (as freeze injury index), survival percent and some vegetative details in each temperature. The results showed that there was a significant difference ($p \leq 0.05$) between genotypes in electrolyte leakage and LT50. Increasing of betaine in tolerant genotype caused decrease of electrolyte leakage but was not effective in sensitive genotype. In addition, there was relative high correlation between electrolyte leakage and LT50 ($r=0.47$). This indicates that electrolyte leakage has high efficiency for determination of injury percent and freezing tolerance. There was a significant difference between genotypes for LT50 and RDMT50 but no difference among betaine levels so it is necessary to use high levels of betaine for exogenous application. Response of genotypes for survival percent and some vegetative details was different but finally tolerant genotype had better recovery ability in comparison with sensitive genotype.

Keywords: Betaine, cold, freezing, electrolyte leakage, LT50, RDMT50.

1- Contribution from College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.