



## QUADRATIC EQUATION $x^2 - x - 1 = 0$ AND LUCAS AND FIBONACCI SEQUENCES WITH EMPHASIS ON SEQUENCES IN SCHOOL TEXTBOOKS

HOJATOLLAH LAELI DASTJERDI\*

Department of Mathematics Education, Farhangian University, PO Box 889-14665, Tehran, Iran  
h.laeli@cfu.ac.ir

**Abstract.** In this article, we will examine some points related to sequences in school textbooks. By examining the school and university textbooks, it can be seen that the sequences are presented in the textbooks very briefly, which has caused students to face problems in the university. Because there are many topics such as limit, continuity, derivative and integral, existence of limit or continuity or not of some functions, and even other topics in discrete mathematics or geometry books to know the concept and characteristics of sequences. In addition, there are many sequences, each of which, depending on whether they are convergent or divergent, have interesting features that can be useful for teaching. In this article, considering the roots of an equation in the second dimension, we will introduce and examine the Lucas and Fibonacci sequences. In the following, we will discuss the characteristics of this biped and check their relationship with each other.

2020 Mathematics Subject Classification. 97C30, 97C70, 97D60.

Keywords. Equation, sequence, Lucas, Fibonacci, Matrix.

Date: Received 21-6-2024 Revised 13-8-2024 Accepted 24-9-2024 Available Online 26-9-2024  
©Ferdowsi University of Mashhad.



## معادله درجه دوم $x^2 - x - 1 = 0$ و دنباله‌های لوکاس و فیبوناچی با تأکید بر دنباله‌ها در کتب درسی مدرسه

حجت اله لعلی دستجردی\*

گروه آموزش ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی ۸۸۹-۱۴۶۶۵، تهران، ایران

[h.laeli@cfu.ac.ir](mailto:h.laeli@cfu.ac.ir)

چکیده. در این مقاله به بررسی برخی نکات مربوط به دنباله‌ها در کتب درسی مدرسه می‌پردازیم. با بررسی کتاب‌های درسی مدرسه و دانشگاه مشاهده می‌شود که دنباله‌ها در کتاب‌های درسی به طور خیلی خلاصه ارائه شده‌اند که این باعث شده است در ادامه و در دانشگاه، دانشجویان با مشکل روبرو شوند، چرا که مباحث زیادی مانند حد، پیوستگی، مشتق و انتگرال، وجود حد یا پیوسته بودن یا نبودن بعضی از توابع و حتی مباحث دیگری چه در کتاب‌های ریاضیات گسسته و یا هندسه به دانستن مفهوم و ویژگی‌های دنباله‌ها بستگی دارد. علاوه بر این دنباله‌های زیادی وجود دارند که هر کدام با توجه به این که همگرا یا واگرا باشند ویژگی‌های جالبی دارند که می‌توانند برای آموزش مفید باشند. در این مقاله با توجه به ریشه‌های یک معادله درجه دوم به معرفی و بررسی دو دنباله لوکاس و فیبوناچی می‌پردازیم. در ادامه به ویژگی‌های این دو دنباله پرداخته و ارتباط آنها با یکدیگر را بررسی می‌کنیم.

### ۱. پیشگفتار

یکی از مباحث مهم در ریاضیات بحث دنباله‌هاست. اعداد طبیعی، اعداد اول و... مثال‌هایی از دنباله‌ها هستند. آشنایی با دنباله‌ها برای دانش‌آموزان از ابتدای تحصیل در نظر گرفته شده است. با نگاهی به کتاب‌های

2010 Mathematics Subject Classification. 97C30, 97C70, 97D60.

واژگان کلیدی. معادله، دنباله، لوکاس، فیبوناچی، ماتریس.

تاریخ: دریافت ۱۴۰۳/۴/۱ بازنگری ۱۴۰۳/۵/۲۳ پذیرش ۱۴۰۳/۷/۳ انتشار برخط ۱۴۰۳/۷/۵

نحوه ارجاع به این مقاله: ح. دستجردی، معادله درجه دوم  $x^2 - x - 1 = 0$  و دنباله‌های لوکاس و فیبوناچی با تأکید بر دنباله

ها در کتب درسی مدرسه، به سوی علوم ریاضی، ۴ (۱۴۰۳)، شماره ۱، ۸۴-۹۶.

© دانشگاه فردوسی مشهد.

درسی جدید و قدیم به نظر می‌رسد که باید توجه بیشتری به این مبحث صورت گیرد. چرا که پایه و اساس خیلی از مطالب در ریاضیات، دنباله‌هاست. در ادامه به بررسی بعضی از مفاهیمی که در کتاب‌های درسی در مورد دنباله‌ها آمده است می‌پردازیم.

در کتاب ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی رشته ریاضی [۱] چاپ ۱۳۹۰ و در صفحه ۲۷ در قسمت استقرای ریاضی مثالی به صورت زیر ارائه شده است:

چند جمله‌ی اول دنباله‌ای موسوم به دنباله‌ی لوکا عبارت اند از

$$1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, \dots$$

اگر جمله  $n$ ام را با  $L_n$  نمایش دهیم، این دنباله با رابطه به اصطلاح بازگشتی

$$L_n = L_{n-1} + L_{n-2}, \quad n \geq 3,$$

و شرایط اولیه  $L_2 = 3, L_1 = 1$  به دست می‌آید. با استفاده از اصل استقرای قوی ریاضی ثابت می‌کنیم که به ازای هر عدد طبیعی  $n$

$$L_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n.$$

این مثال یک مثال کاملاً انتزاعی و ارائه آن بدون هیچ مقدمه و هیچ شناختی می‌تواند باعث بی‌انگیزگی دانش‌آموزان شود. البته این مثال در سال‌های بعد از کتاب درسی مدرسه حذف شده است. ذکر این نکته مهم است که جمله اول این دنباله عدد ۲ است که در کتاب درسی نوشته نشده است. نکته قابل تأمل این است که با نگاهی به کتاب‌های درسی مدرسه ملاحظه می‌شود که فقط درس سوم از فصل اول ریاضی دهم [۲] و فصل اول حسابان ۱ [۳] به دنباله‌ها اختصاص داده شده است. در ابتدا به تعریف الگو و سپس تعریف دنباله پرداخته شده است و در ادامه نیز دنباله حسابی و هندسی معرفی شده‌اند. البته یکی از بدفهمی‌هایی که در این درس برای دانش‌آموزان ممکن است اتفاق بیفتد، تعریف دنباله خطی است که در صفحه ۱۶ کتاب ریاضی دهم تعریف شده و عبارت  $an$  در تعریف الگوی خطی است که با موارد  $a_n$  در صفحات بعدی مثل ۱۹، ۱۴ و ۲۰ بدفهمی ایجاد می‌شود. در شکل ۱  $an$  و در شکل‌های ۲ و ۳  $a_n$  داده شده است. یکی دیگر از مواردی که در کتاب حساب، دیفرانسیل و انتگرال [۴] چاپ ۱۳۹۴ وجود داشت، تعریف حد با استفاده از دنباله‌ها است. در شکل‌های ۴ و ۵ تعریف حد با استفاده از دنباله‌ها نمایش داده شده است. همانطور که اشاره شد، این قسمت‌ها نیز در کتاب‌های جدید وجود ندارند. همچنین در این کتاب و در صفحه ۴۵، شکل ۶، دنباله‌ای که به عنوان یک دنباله‌ی مهم عدد نپر را معرفی می‌کند نیز در کتاب‌های جدید حذف شده است. در این مقاله به بررسی مشخصات دنباله لوکاس حذف شده از کتاب و دنباله فیبوناچی با استفاده از یک چند جمله‌ای درجه دو می‌پردازیم. همچنین ارتباط این دو دنباله را با هم بررسی می‌کنیم.


به‌طور کلی الگوهای را که جمله عمومی آنها به صورت  $t_n = an + b$  است، الگوهای خطی می‌نامیم که در آن  $a$  و  $b$  اعداد حقیقی دلخواه و ثابت هستند.

دیدیم که در یک الگوی خطی با جمله عمومی  $t_n = an + b$ ، میزان تغییر جملات متوالی برابر  $a$  بود. به عبارت دیگر، اختلاف هر دو جمله متوالی در این الگوی خطی برابر ضرب  $n$  است. به عنوان مثال در یک الگوی خطی با جمله عمومی  $t_n = -4n + 15$ ، هر جمله نسبت به جمله قبل از خودش ۴ واحد کاهش می‌یابد:

$$11, 7, 3, -1, -5, -9, \dots$$

شکل ۱: تعریف دنباله خطی در صفحه ۱۹ ریاضی دهم

(پ) شکل‌های الگوی صفحه قبل را به صورت زیر تبدیل می‌کنیم. با دقت در تصویر زیر سعی کنید حاصل  $a_n$  را بر حسب  $n$  به دست آورید.



شکل ۲: سوال مربوط به صفحه ۲۰

در ادامه مقاله موارد زیر را خواهیم داشت: در بخش ۲، معادله‌های لوکاس و فیبوناچی معرفی خواهند شد. در بخش ۳، روابط ماتریسی بین این دو دنباله ارائه خواهد شد. در قسمت ۴، نتیجه‌گیری مقاله را خواهیم داشت.

۲. معادله درجه دوم  $x^2 - x - 1 = 0$  و دنباله‌های لوکاس و فیبوناچی

همانطور که می‌دانیم در کتاب ریاضی سال دهم، حل معادله درجه دوم آمده است و مطالب ارائه شده در این مقاله برای دانش‌آموز متوسطه سال دهم، به طور کامل قابل فهم بوده و فقط در پایان از مقادیر ویژه و بردارهای ویژه استفاده شده است. در این صورت این مطالب می‌تواند به عنوان موضوعات پیشنهادی در کتب درسی مدرسه‌ای گنجانده شود.  
معادله درجه دوم

$$x^2 - x - 1 = 0 \quad (1.2)$$

شماره شکل: n	۱	۲	۳	۴	...	n	...
تعداد چوب کبریت ها: $a_n$	۵	۸	۱۱	...	...	...	...
رابطه بین n و $a_n$	$a_1=5$	$a_2=8$	$a_3=11$	...	...	$a_n=...$	...

به عنوان مثال ملاحظه می شود که، «تعداد چوب کبریت های شکل اول برابر ۵ است» که این مطلب را به طور خلاصه به صورت  $a_1=5$  نشان داده ایم (می خوانیم: a اندیس ۱ برابر ۵). عبارت های  $a_1, a_2, a_3$  متغیرهای اندیس دار<sup>۱</sup> نامیده می شوند که مقادیر آنها به ترتیب ۵، ۸ و ۱۱ است. به این اعداد جملات الگو هم گفته می شود. پس در واقع، عدد ۵ جمله اول الگوست؛ ۸ جمله دوم آن و به همین ترتیب الی آخر.

$a_1$	$a_2$	$a_3$
۵	۸	۱۱

الف) با این نمادگذاری،  $a_n$  نشان دهنده چیست و مقدار آن چقدر است؟

ب)  $a_n$  به چه معناست؟

پ) آیا می توانید حاصل  $a_n$  را بر حسب n به دست آورید؟ برای این کار فعالیت بعد را انجام دهید.

شکل ۳: سوال مربوط به صفحه ۱۴

**تعریف:** فرض کنیم D زیرمجموعه ای از  $\mathbb{R}$  و  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  یک تابع باشد، در این صورت، گوئیم حد تابع f در a، عدد حقیقی L است و می نویسیم،  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ، هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط دامنه f مانند  $\{a_n\}$  که به a همگراست ( $a_n \neq a$ )، دنباله  $\{f(a_n)\}$  به L همگرا باشد.

شکل ۴: تعریف صفحه ۷۱ کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی سال ۱۳۹۴

**تعریف ۱:** فرض کنیم تابع D زیر مجموعه ای از  $\mathbb{R}$  و  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  یک تابع باشد، در این صورت، گوئیم حد تابع f در  $a, +\infty$  است و می نویسیم  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ، هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط دامنه f مانند  $\{x_n\}$  که همگرا به a است و  $x_n \neq a$ ،  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = +\infty$ .

شکل ۵: تعریف صفحه ۱۰۶ کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی سال ۱۳۹۴

را در نظر بگیرید. این معادله دارای دو ریشه

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2},$$

**۸-۱- یک دنباله مهم**

$$\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}_{n=1}^{\infty} : 2, \left(\frac{3}{2}\right)^2, \left(\frac{4}{3}\right)^3, \left(\frac{5}{4}\right)^4, \left(\frac{6}{5}\right)^5, \dots$$

دنباله زیر را در نظر می‌گیریم این دنباله هم به لحاظ کاربردی و همچنین از جنبه نظری اهمیت فوق‌العاده دارد. چرا؟ ثابت می‌شود این دنباله همگراست و هرگاه حد آن را  $e$  بنامیم، یعنی

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

عدد حقیقی  $e$  به صورتی طبیعی، در بیشتر پدیده‌های خلقت ظاهر می‌شود. دو دسته از مهم‌ترین پدیده‌ها فرایندهای رشد و زوال هستند. در اولی کمیت مورد مطالعه (نسبت به زمان) رشد می‌کند و در پدیده دوم کمیت مورد بحث رو به زوال دارد. برای مثال: وقتی تعداد اندکی باکتری را در محیطی مناسب قرار می‌دهیم، به شدت رشد کرده و پس از زمان اندکی تعداد آنها ۲، ۳ و یا صد برابر می‌شود. در حالی که هرگاه مقداری ماده رادیواکتیو مانند فلزهای اورانیوم، پلوتونیوم، و یا انشتانیوم را داشته باشیم، پس از مدتی مقدار آن کاهش یافته، یعنی بخشی از ماده زوال یافته و به عناصر دیگری مبدل می‌گردد. عدد  $e$  در چنین پدیده‌هایی نقشی اساسی دارد، به گونه‌ای که در محاسبات مربوط به رشد و زوال به صورتی طبیعی بروز می‌کند.  $e$  در اقتصاد نیز مطرح می‌شود. از این بابت لگاریتمی که پایه آن عدد  $e$  باشد لگاریتم طبیعی نامیده می‌شود.

شکل ۶: معرفی یک دنباله مهم در صفحه ۴۵

است. چون  $\alpha$  ریشه معادله (۱.۲) است، در این صورت در معادله صدق می‌کند و خواهیم داشت:

$$\alpha^2 = 1 + \alpha. \quad (2.2)$$

حال با توجه به اینکه  $\alpha^3 = \alpha^2 \alpha$  و با استفاده از رابطه (۲.۲) خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \alpha^3 &= \alpha^2 \alpha \\ &= (1 + \alpha)\alpha \\ &= \alpha + \alpha^2 \\ &= \alpha + (1 + \alpha) = 1 + 2\alpha. \end{aligned} \quad (3.2)$$

با ادامه این روش می‌توان نشان داد که

$$\alpha^4 = 2 + 3\alpha, \quad \alpha^5 = 3 + 5\alpha. \quad (4.2)$$

با در نظر گرفتن موارد به دست آمده

$$\begin{aligned}\alpha &= 0 + \alpha, \\ \alpha^2 &= 1 + \alpha, \\ \alpha^3 &= 1 + 2\alpha, \\ \alpha^4 &= 2 + 3\alpha, \\ \alpha^5 &= 3 + 5\alpha,\end{aligned}\tag{۵.۲}$$

به دنبال پیدا کردن الگوی مورد نظر هستیم. برای پیدا کردن الگو به ازای  $n$  و این که  $\alpha^n$  به چه صورت خواهد بود، به معرفی دنباله فیبوناچی می‌پردازیم. این دنباله به صورت زیر است:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$$

رابطه بازگشتی این دنباله به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned}F_0 &= 0, \\ F_1 &= 1, \\ F_{n+2} &= F_{n+1} + F_n, \quad n \geq 0.\end{aligned}\tag{۶.۲}$$

این دنباله دارای ویژگی‌های بسیار جالبی است که در بسیاری از منابع بررسی شده است. برای پیدا کردن رابطه‌ای برای  $\alpha^n$ ، فرض می‌کنیم

$$\alpha^n = p + q\alpha.\tag{۷.۲}$$

حال با در نظر گرفتن و مقایسه دو رابطه (۵.۲) و (۷.۲) مشاهده می‌شود که عدد ۲ در  $\alpha^4$ ، همان  $F_3$  است و ضریب  $\alpha$  نیز  $F_4$  است. به همین صورت در  $\alpha^5$  عدد ۳ مقدار  $F_4$  است و ضریب  $\alpha$  برابر  $F_5$  است. پس با توجه به نکات گفته شده خواهیم داشت:

$$p = F_{n-1}, \quad q = F_n.$$

در این صورت داریم:

$$\alpha^n = F_{n-1} + F_n\alpha, \quad n \geq 1.\tag{۸.۲}$$

با روشی مشابه، برای ریشه دوم معادله نیز خواهیم داشت:

$$\beta^n = F_{n-1} + F_n\beta, \quad n \geq 1.\tag{۹.۲}$$

معادله درجه دوم  $x^2 - x - 1 = 0$  و دنباله‌های لوکاس و فیبوناچی

حال اگر روابط (۸.۲) و (۹.۲) را از هم کم کنیم خواهیم داشت:

$$\alpha^n - \beta^n = F_n(\alpha - \beta). \quad (10.2)$$

در این صورت دنباله  $F_n$  عبارت است از

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right). \quad (11.2)$$

حال می‌خواهیم مقدار

$$\frac{\alpha^n + \beta^n}{\alpha + \beta}, \quad (12.2)$$

را که خود دنباله‌ی جدیدی است، مشخص کنیم. می‌دانیم که  $\alpha + \beta = 1$ ,  $\alpha\beta = -1$ . اگر فرض کنیم

$$L_n = \frac{\alpha^n + \beta^n}{\alpha + \beta} = \alpha^n + \beta^n. \quad (13.2)$$

در این صورت خواهیم داشت:

$$L_0 = 2,$$

$$L_1 = 1,$$

$$L_2 = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - \alpha\beta = 3,$$

$$L_3 = \alpha^3 + \beta^3 = 4,$$

$$L_4 = 7,$$

$$\vdots \quad (14.2)$$

در این صورت رابطه بازگشتی زیر را برای این دنباله تعریف می‌کنیم:

$$L_0 = 2,$$

$$L_1 = 1,$$

$$L_{n+2} = L_{n+1} + L_n, \quad n \geq 1. \quad (15.2)$$

این دنباله را دنباله لوکاس<sup>۱</sup> می‌نامیم. البته رابطه (۱۵.۲) را می‌توان به صورت زیر نیز اثبات کرد:

---

Lucas<sup>۱</sup>



$$\begin{aligned}
L_{n+1} + L_n &= \alpha^{n+1} + \beta^{n+1} + \alpha^n + \beta^n, \\
&= \alpha^n(\alpha + 1) + \beta^n(\beta + 1), \\
&= \alpha^n \alpha^2 + \beta^n \beta^2, \\
&= \alpha^{n+2} + \beta^{n+2}, \\
&= L_{n+2}, \quad n \geq 1.
\end{aligned} \tag{۱۶.۲}$$

که در این رابطه به دلیل این که  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله  $x^2 - x - 1 = 0$  است، خواهیم داشت:

$$\alpha^2 = \alpha + 1, \quad \beta^2 = \beta + 1$$

همچنین اگر معادله تفاضلی

$$L_{n+2} = L_{n+1} + L_n, \quad n \geq 1, \tag{۱۷.۲}$$

را در نظر بگیریم، این معادله دارای معادله مشخصه زیر است:

$$x^2 - x - 1 = 0. \tag{۱۸.۲}$$

که دارای دو ریشه  $\alpha$  و  $\beta$  است. پس جواب عمومی رابطه بازگشتی (۱۷.۲) به صورت زیر است:

$$L_{n+2} = c_1 \alpha^n + c_2 \beta^n, \quad n \geq 1. \tag{۱۹.۲}$$

که با در نظر گرفتن

$$L_0 = 2, \quad L_1 = 1,$$

ضرایب  $c_1 = 1$  و  $c_2 = 1$  به دست می‌آید. پس نتیجه زیر را برای دو دنباله لوکاس و فیبوناچی به صورت زیر خواهیم داشت که فرمول‌های باینت<sup>۲</sup> نامیده می‌شوند:

$$\begin{aligned}
L_n &= \alpha^n + \beta^n, \\
F_n &= \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}.
\end{aligned} \tag{۲۰.۲}$$

در ادامه به معرفی بعضی از روابط جالب بین دنباله لوکاس و فیبوناچی به صورت زیر می‌پردازیم [۷، ۸]:

$$\begin{aligned} L_n &= F_{n-1} + F_{n+1} = 2F_{n+1} - F_n, \\ F_{2n} &= L_n F_n, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L_n}{F_n} &= \sqrt{5}. \end{aligned} \quad (21.2)$$

یکی دیگر از روابطی که برای هر دو دنباله وجود دارد رابطه‌ی کزینی<sup>۳</sup> به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} L_n^2 - L_{n-1}L_{n+1} &= 5(-1)^n, \\ F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 &= (-1)^n. \end{aligned} \quad (22.2)$$

روابط جالب دیگری وجود دارد که خواننده علاقه‌مند می‌تواند برای مطالعه به منابع [۵، ۶] مراجعه کند.

### ۳. ارتباط ماتریسی دنباله‌های لوکاس و فیبوناچی

در ادامه به بررسی ماتریسی دنباله‌های فیبوناچی و لوکاس می‌پردازیم. روابط زیر را برای دو دنباله فیبوناچی و لوکاس داریم:

$$\begin{aligned} F_{n+1} + F_{n-1} &= L_n, \\ L_{n-1} + L_{n+1} &= 5F_n. \end{aligned} \quad (1.3)$$

ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$Q = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad (2.3)$$

رابطه (۱.۳) را به صورت معادله‌های ماتریسی زیر خواهیم داشت:

$$\begin{bmatrix} L_{n+1} \\ L_n \end{bmatrix} = Q \begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

یا

$$5 \begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} = Q \begin{bmatrix} L_n \\ L_{n-1} \end{bmatrix}. \quad (4.3)$$

حال قضیه زیر را برای  $Q^n$  به صورت زیر داریم.

قضیه ۱.۳. فرض کنید  $Q$  ماتریس تعریف شده در (۲.۳) باشد. در این صورت

$$Q^n = \begin{cases} 5^{\frac{n}{2}} \begin{bmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{bmatrix} & \text{اگر } n \text{ زوج،} \\ \begin{bmatrix} L_{n+1} & L_n \\ L_n & L_{n-1} \end{bmatrix} & \text{اگر } n \text{ فرد،} \end{cases}$$

در ادامه با استفاده از  $Q^n$ ، فرمول‌هایی که مشهور به فرمول‌های باینت هستند را با استفاده از روش ماتریسی به دست می‌آوریم [۷].

قضیه ۲.۳. فرض کنید  $n$  عدد طبیعی باشد. در این صورت روابط زیر را خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} L_n &= \alpha^n + \beta^n, \\ F_n &= \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}. \end{aligned} \quad (5.3)$$

اثبات. ماتریس  $Q$  را در نظر بگیرید. چند جمله‌ای مشخصه این ماتریس عبارت است از

$$\lambda^2 - 5\lambda + 5 = 0.$$

در این صورت مقادیر ویژه این ماتریس عبارت است از

$$\lambda_1 = \sqrt{5}\alpha, \quad \lambda_2 = \sqrt{5}\beta.$$

بردارهای ویژه متناظر با این دو مقدار ویژه نیز عبارتند از

$$V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -\beta \end{bmatrix} \quad (6.3)$$

و

$$V_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -\alpha \end{bmatrix} \quad (7.3)$$

که  $V_1$  بردار ویژه متناظر با  $\lambda_1$  و  $V_2$  بردار ویژه متناظر با  $\lambda_2$  می‌باشد و  $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$  و  $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ . در این صورت ماتریس  $Q$  قطری شدنی است و می‌توان نوشت:

$$V = U^{-1}QU$$

که در آن

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{bmatrix}$$

و

$$V = \begin{bmatrix} \sqrt{5}\alpha & 0 \\ 0 & \sqrt{5}\beta \end{bmatrix}.$$

با توجه به ویژگی‌های ماتریس‌های متشابه داریم:

$$V^n = U^{-1}Q^nU, \quad Q^n = UV^nU^{-1}.$$

پس داریم:

$$Q^n = 5^{\frac{n-1}{2}} \begin{bmatrix} \alpha^{n+1} + (-\beta)^{n+1} & \alpha^n - (-\beta)^n \\ \alpha^n - (-\beta)^n & \alpha^{n-1} + (-\beta)^{n-1} \end{bmatrix}.$$

□

#### ۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله به معرفی یک معادله درجه دو و ارتباط آن با دنباله‌های لوکاس و فیبوناچی پرداختیم. در کتب درسی متوسطه به طور خیلی خلاصه به این مفهوم پرداخته شده است. در صورتی که می‌توان با اختصاص مفاهیم بیشتر و با توجه به ساده بودن و کاربردی بودن آن در تعریف حد، پیوستگی، مشتق و انتگرال دانش‌آموزان را در دوره متوسطه با این مفاهیم آشنا نمود.

#### مراجع

- [۱] ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی (کد کتاب ۲۹۶/۱)، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، چاپ هفدهم، ۱۳۹۰.
- [۲] ریاضی (۱) - پایه دهم دوره دوم متوسطه، ۱۱۰۲۱۱، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، چاپ هشتم، ۱۴۰۲.
- [۳] حسابان (۱) - پایه یازدهم دوره دوم متوسطه، ۱۱۱۲۱، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، چاپ هفتم، ۱۴۰۲.
- [۴] حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی (کد کتاب ۲۹۵/۱)، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، چاپ چهارم، ۱۳۹۴.

- [6] V. E. Hoggatt , *Fibonacci and Lucas Numbers*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1969.
- [7] F. Kohen and D. Bozkurt, *On lucas numbers by the matrix method*, Hacet. J. Math. Stat., **39** (2010) 471–475.
- [8] T. Koshy, *Fibonacci and Lucas Numbers with Applications*, Wiley, Interscience, New York, 2001.